Niedersächsische Stauden-, Dahlienund Wasserpflanzen-Kulturen

von

# Heinrich Junge Hameln (Weser)

(Provinz Hannover)



»Blühende Trockenmauer« am Seerosenbassin mit Plattenweg im Schaugarten meiner Gärtnerei.

Deutscher Schriftwechsel. English correspondence. Correspondance française.

1929

33. Jahrgang

1929

#### Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße

etwa 30 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof und 40 Minuten von Station Hameln-Klüt. Mit dem Autobus vom Hauptbahnhof bis Haltestelle Erichstraße, von dort 10 Minuten zu Fuß bis zur Gärtnerei, oder vom Hauptbahnhof bis Haltestelle Rathaus, von dort 15 Minuten zur Gärtnerei.

## Zur gefl. Beachtung!

Die Nomenklatur ist nach dem neuen Werke Dr. Zanders →Botanisches Handwärterbuch«, herausgegeben vom Reichsverband des Deutschen Gartenbaues, bis auf einige nach nicht festgesetzte Namen durchgeführt. Die alten Namen verweisen stets auf die neuen.

#### Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise sind in Goldmark und zwar 1 Goldmark Dollar U. S. A. gestellt und entsprechen den festgesetzten Bedingungen des B. D. St. und der D. Da-G.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schaden durch höhere Gewalt, wie Streiks im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

Versand nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.

Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Erfüllungsart und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen. Für Packungs- und Portaunkosten füge ich stets einige Gratisbeigaben hinzu.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zur gütlichen Ausgleichung von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt!

Meine Firma ist Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft und des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues.

Versand nach allen Ländern der Welt. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge Hameln.
Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln.

Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 3129 Hannover.

Die alte Rattenfängerstadt Hameln (mit 30000 Einwohnern) im Regierungsbezirk

Hannover breitet sich innerhalb einer hervorragend schönen Umgebung am

Einfluß der Hamel in die Weser aus.

Hameln liegt an den Bahnlinien Hannover-Altenbeken, Halle-Löhne und Hameln-Lage-Bielefeld und ist Haltepunkt der Eilzüge Berlin-Köln, Köln-Leipzig und umgekehrt.

#### Inhaltsverzeichnis der Gruppen A.-O.

	Markathan	Seite	1	u	Moorbeetpflanzen	Seite	24
A.	Neuheiten	Selle	4.	II.	Moorbeerprionzen	Selle	20
В.	Allgem, Sammlung v. Stauden	30	5		Secrosen (Nymphaeen)	H	27
C.	Niedrige Stauden	24	16	K.	Sumpf- und Wasserpflanzen	30	29
	Winterharte Kakteen	- 10	21	L.	Winterharte Ziergräser	26	30
E.	Winterharte Freilandfarne	25	22	M.	Aquarienpflanzen	44	31
F.	Feuchtigkeit liebende Staude	n "	24	N.	Gladiolen	11	32
G.	Felsensträucher und Schlinger		24	0.	Sortimente	- 11	32



Aster amellus »Kobold« (Eigene Züchtung)
Eine dreijährige Pflanze in den Anlagen meiner Gärtnerei.

Aster am. »Kobold« wurde in England 1928 durch Verleihung des »Award of Merits ausgezeichnet.

#### A. Neuheiten,

seltene und durch ihre Schönheit besonders wertvolle Stauden.

# 1. Neuheiten und besonders wertvolle Stauden eigener Zucht.

Aster amellus. Großblumige, reichblühende Staudenastern für Landschafts-Gärtnerei, für Topfpflanzenkultur und zum Blumenschnitt. (Alle Sorten wurden beschrieben und teils abgebildet in »Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung« Jahrgang 1922 Nr. 7 und 9)

Garmer-Zenonge Jamgang 1722 Nr. 7 und 9	
Perkeo. 1924. Neue niedrige Zwergsorte, die für Beet- und Gruppen- bepflanzung wertvoll ist. Früh und ungeheuer reichblühend. Dunkelblau mit braun umsäumter gelber Mitte, Blume rundlich	3.00 1.50
Lichtblick. 1922. Sehr großblumig, hellrasa, in reich verzweigten Rispen	1.00
blühende Prachtsorte. SeptOkt	2.50
0	
Deutscher Sieger. 1916. Dunkelrot, niedrig, frühblühend  Deutsche Treue. 1920. Leuchtend rosa, hoch, spätblühend  Herbstfreude. 1920. Rosa-lila, sehr großblumig, mittelfrüh  Herbstkönigin. 1914. Lila, großblumig, gedrungen wachsend, ungeheuer	1.50 1.50 1.50
Hunold. 1921. Dunkelblau, strahlige Blume, locker gebaute Pflanze  Kobold. 1920. Niedrig, kugelig, früh und anhaltend blühend, purpurblau  Modekind. 1920. Mittelfrüh, purpurlila.  Silberblick. 1920. Großblumig, silberrosa. Schönste aller hellrosa blühenden	2 1 1.20 1.50
Sorten	1.20
Weserruhm. 1914. Straff aufrecht, rundliche Blume, rosa mit leuchtend gelber Mitte	2.50
Viktoria. 1914. Straff aufrecht, rundliche Blume, dunkelblau mit braun um- säumter gelber Mitte	2.50

	1 St. M-
Aster ericoides Erikönig. Hell lilafarbige, reichblühende Abart	0.50
Aster ericoides Schneetanne. Meterhoch, Sept.—Okt. blühend, in reich mit kleinen weißen Sternblüten beladenen Zweigen	0.50
Aster hybridus Himmelskönigin. Eigenartig schöne, 80 cm hohe Herbst- aster mit dunkel purpurroten Knospen in dichten Rispen, mit den leuchtend-	
purpurblauen großen, offenen Blüten prächtig kontrastierend	0.80
Campanula persicifolia gigantea-Hybriden. Neue riesenblumige Rasse eigener Züchtung.	
Ausgesuchte Forben, blau und weiß, in verschiedenen Schattierungen,	
einfach und gefüllt	0.80
Helenium hybridum Goldene Jugend. 1924. Ein Sämling meiner rühm- lichst bekannten Züchtung »Julisonne«, besitzt die Neuheit alle guten Eigenschaften der Mutter in bezug auf Wuchs, Blütezeit und Dauer der Blüte, aber »Goldene Jugend« hat rein goldgelbe, große edelge- formte Blumen. Hauptblütezeit Juli, remontiert bis zum Frost. Prachtvolle	
Neuheit eigener Zucht	1.20



Helenium hybridum Wesergold. (Eigene Züchtung.)

Helenium hybridum Wesergold. 1928. Eigene Züchtung. Prachtvolle neue Schmuck- und Schnittstaude von niedrig geschlossenem, straff aufrechtem Wuchs. Hauptblütezeit Juli-August, bis zum Frost stark nachblühend. Große,	
rein dunkel-zitronengelbe Blüten mit braunroter Mitte. 60—80 cm hoch  Phlox setacea Elfe. 1929. Reizender, gedrungen wachsender, kurzlaubiger  Polsterphlox, im Wuchs dem Phlox nivalis ähnelnd, aber mit zierlichen,	1.50
zart rosa-lila Blütchen bedeckt. Blütezeit April-Mai. Eine wertvolle Bereicherung des Phlox setacea-Sortimentes. 10 cm hoch.  Trollius hybridus praecox. Neue frühblühende Hybriden eigener Züchtung	0.80
2. Neuheiten anderer Züchter und besonders wertvolle Stauden.	
Annual to the College Wind Enthlith and disht and the and against the college to	
Anemone japonica Bühler Kind. Frühblühend, dicht gefüllt, anfangs rahm- weiß, später in Weiß übergehend	1
weiß, später in Weiß übergehend  Anemone japonica Frau Magdalene Uhink. Blumen gut gefüllt, hell lila- rosa, 60–80 cm hoch. September-Oktober	1 0.80 0.80



Philox setacea Elfe (Eigene Züchtung), an einer Trockenmauer in meinem Schaugarten.

			5t. M.
		rulea hybrida (haylodgensis). Langgespornte, neue Hybriden, ig und aufrecht wachsend, Juni-Juli.	
car	ndidiss	itronengelb. cuprea, kupferrot, Mitte gelblich. delicatissima, zartrosa mit gelb.	
		ida Schöne von Fellbach. Rein rosalila, nicht verblassend,	
		den fast doppelt so groß wie bei den anderen Sorten	0.40
037	er, der	Hermann Löns. Prächtige neue, 50 cm hochwerdende Stauden- en graße, eigenartig porzellanblau gefärbte Blüten in dichten	1.50
		die Pflanzen überdecken	1.50
Ashibe	lybrid	a (Arendsii) Frieda Klapp. Wuchs aufrecht, Rispen lang, dunkel karmin — purpur, 80 cm. August	0.80
-17	"	Gloria purpurea. Dunkellaubige Abart der beliebten Astilbe Gloria mit leuchtend roten Blütenrispen	0.80
-	*/	Grete Püngel. Kräftig wachsend, 70—80 cm hoch, Blüten- rispen schmal, mit wagerecht abstehenden Seitenähren. Schön hellrosa	0.80
		Hanna Stodt. In Wuchs und Haltung der Grete Püngel	0.00
.00	**	ähnlich, Blütenrispen leuchtend karminrosa	0.80
in	**	Rispen. Rein lachsrosa, 60—70 cm. Juli-August	0.80
196	-07	Lydia Hagemann. Reichverzweigte, lange Rispen mit perl- artigen, rein lachsrosa Blüten. Wertvoll zum Schnitt, 80—90 cm.	
		Juli-August	0.80
Name of the last	er beid	Weiße Gloria. Ein prächt. Gegenstück z. d. bekannten älteren Sorte »Gloria«, von gedrungenem Wuchs. 50—60 cm. Juli . a crispa-Varietäten. 1923. Niedr., eigenart. schöne Kreuzungen.	0.80
Gn	om.	Frischrosa autverzweigte kleine Pisnen	
Ko	bold.	Rispen dunkelrosa.  G. Großblumig, hellrosa mit dunkleren Spitzen.  Alle 3 Sorten 1 Stück:	0.80
WO	chsende	cifolia hybrida. 1923. Reizende, 20—30 cm hohe, kräftig e und reichblühende Schmuckstauden für Rabatten, Felsengärten zum Topfverkauf geeignet.	
alt	von	it zierlichen, überhängenden weißen Rispen in großer Menge, Juli-August über dicht belaubten Pflanzen. Fleischfarbig-rosa blühend, sonst wie vorige.	
ros	sea. Be	esonders zierlich und überhängend, frisch rosa. Alle 3 Sorten 1 St.:	0.80
		Rispen sind von leuchtend lachsrosa Farbe	1,-

		1 St. M.
Aster lichiangensis. Schöne, neue alpine Aster aus Westchin artig angeordnetem Laubwerk. Blüten groß, auf 30-40 cm		
getragen. Purpurn mit goldigbrauner Mitte. Mai-Juni Aster yunnanensis. Ebenfalls aus Westchina eingeführter sommerblüher, ähnlich subcaeruleus. Blüte groß, a	wertvoller Vor-	0.80
langen Stielen, leuchtend blau		0.70
aster mit weitausladenden Zweigen. Weiß  Azalea Arendsii. Siehe hinten, Abtlg. H.		0.70
Cardamine pratensis lilacina plena. Reizendes, gefülltblüh schaumkraut für feuchte Lagen. 30 cm. April	nendes Wiesen-	0.50
Cotyledon simplicifolia. Interessante Felsenpflanze mit zie Blütenrispen und fleischigen Blättern. 10—20 cm hoch	rlichen gelben	0.60
Delphinium hybridum Baldershage. Sehr große Blütenris blauen, halbgefüllten Blumen und weißem Auge. Die ga		
gleichzeitig erblühend.  Delphinium hybridum Die Blonde. Halbgefüllt, kobaltblaufarbiger Mitte. Straff aufrecht, große, reichverzweigte Rispe		1.50
Delphinium hybridum Mikie Ruys. Prachtvolle Neuheit. Blu		1.50
halbgefüllt, rahmweiß mit gelbem Auge. 90 cm	nblaue Blumen	1.50
Delphinium hybridum van Veens Triumph. Prachtvolle neu- und widerstandsfähig. Blüten halbgefüllt von zart rosalila Fö	e Sorte, gesund Erbung, 120 cm	2
Delphinium hybridum Vollendung. Tief kabaltblau, halba	gefüllt. Große,	2
reichverzweigte Rispen von 150 cm Höhe  Helleborus niger var. praecox. Frühblühende Christrose	éstalistas dis	1.50
Helenium autumnale hybridum nanum praecox. Niedr. 4 Wochen vor der Stammsorte mit der Blüte beginnen, 40—80 Helenium nanum coccineo-bruneum. Frühblühend, 50-	0 cm, AugOkt.	0.40
Dunkelscharlach mit braunem Schein  Irls germanica Bele. Dom lichtlila, Hängeblätter stark weinra		0.80
blühend. Vorzügliche Neuheit		1.50
" Flammenschwert. Bedeutende Verbesserung Sorte Iriskönig		2.50
gelber Aderung		1.50
blühend. 120 cm hoch .		0.70
"  Richard II. Dom reinweiß, Hängeblätter schw weißer Umrandung. Eine der allerschönsten Ir	arzpurpurn mit	5.—
Rota. Dom glänzend karminrosa, Hängeblätt		2
Iris sibirica Perry's Blue. Lichtblaue, große Blume auf hahen	n, starken Stiel.	0.70
60—80 cm. Juni  Lilium regale. (Königslilie.) Idealsorte für jeden Garten. S aufrechtwachsende, prächtige, großblumige Lilie. Durchmesse Blüten 15—18 cm. Reinweiß, im Schlunde kanariengelb.	er der einzelnen	0.70
Papaver orientale May Queen. Neuer Riesenmohn mit de	unkellachsroten,	2
Papaver orientale Wunderkind. Große edle Blume von prökarminrosa Färbung	chtiger dunkel-	1.50
Phlox paniculata (decussata):		
Georg Stipp. Großblumia, lachsrot mit karminfarbigem	Auge. Wuchs	
gedrungen mit großen Dolden Leo Schlageter. Leuchtend scharlachkarmin mit orangefa Kräftig und gesund wachsend, unempfindlich gegen Rege		0.80
brand. Mittelfrüh		0.80
Gesund und widerstandsfähig	großblumig .	0.50
Paul Hoffmann. Leuchtend magenta-karminrot mit dunkler Stiele und Belaubung dunkel, auffallende neue Sorte	Mitte, 1 m hoch,	0.80

Phlex paniculates	1 St. M.
Phlox paniculata: Rosenkavalier. Sehr große Blüten von kräftig rein-rosenroter Gesund und kräftig wachsend	
Gesund und kräftig wachsend	end . 0.60
Primula hybrida Helenae Purpurkissen. Reichblühende Frühlings	primel
von schöner purpurroter Farbe	
Pyrethrum roseum hybridum Eileen May Robinson. Sehr großb	1.50 lumig, 1.50
Pyrethrum roseum hybridum Perkeo. Von niedrigem, zwergartigem \ ähnlich dem P. roseum nanum, aber mit leuchtend dunkelroten	Wuchs,
Pyrethrum roseum hybridum Orlando. Sehr großblumig, straff au leuchtend karminrot	
Sedum spathulatum purpureum. Braunrote Blattrosetten mit graub Hauch und gelben Blüten. Sehr wirkungsvoll	lauem . 0.60
Sempervivum hybridum Alpha. In der Mitte weiß behaarte Rosette bräunlich-grüner Farbe Sempervivum hybridum Beta. Mittelgroße Rosetten brauner Blätter,	0.70
weiß besponnen	0.70
verzweigten Rispen zierlicher, dunkelgoldgelber Blütchen, 80 cm. A Solidago hybrida Goldschleier. Mit pyramidalen Rispen, deren leud goldgelbe Blütchen die Pflanze wie mit einem Schleier überd	August 0.80 Chtend
60—80 cm	0.80 ugosa
(aspera) mit reich verzweigten, lang überhängenden Rispen gold; Blütchen, an italienische Mimosen erinnernd, 150 cm. September Veronica hybrida Shirley blue. Kräftig wachsende, kriechende	1
dunkelblau	0.80
/eronica teucrium prostrata alba. Reinweiß	0.50
pallida. B'äulichweiß Beide Sorten blühen etwa 14 Tage vor der allgemein beliebten Veronica rup	
Viola cornuta Hansa. Beachtenswerte Verbesserung des Wermig-Veil mit edlen, reingefärbten Blumen	0.40
Blumen größer als die der Stammart, samtigviolett	0.60
Viola odorata Riese von Botnang. Vorzügliches großblumiges und stieliges dunkelblaues Veilchen. Reichblühend	
B. Allgemeine Sammlung von Schnund Schnittstauden.	nuck-
Salatina dilla sandalla sala sana standarda Dendra da Maria Catada a tanàna da	15t. M.
Achillea filipendulina (eupatorium) Parker's Var. Schafgarbe, gold 70—80 cm, Juli-August ,, millefolium Cerise Queen. Kirschrot, 40—50 cm, Juni-Septe	0.70
" ptarmica grandiflora fl. pl. Perry's White. Weißgef., 60—8	30 cm, . 0.40
Aconitum napellus. Eisenhut, dunkelblau, 100—150 cm, Juli-August	. 0.60
" lycoctonum pyrenaicum. 100—150 cm hoch mit gelbl. Blüten	
", napellus bicolor. Blau und weiß, 100-150 cm, Juli-August Wilsonii. Lichtblau, 100-150 cm, September	0.60
Actaea. Siehe Cimicifuga. Aetheopappus pulcherrimus siehe Centaurea pulcherrima.	
Althaea rosea plena. Stockrose in allen Farben, 200 cm, Juni-Augus Anchusa italica var. Dropmore. Ochsenzunge. Meterhohe pyran	
Rispen, dunkelblau. Juni-Juli	. 0.60
Anchusa myosotidiflora. Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50—60 cm Anemone japonica. Neuheiten siehe vorn unter Abt. A	
" Honorine Jobert. Reinweiß, 60-100 cm, Herl	
,, Prinz Heinrich. Dunkelrosa, 50 - 60 cm, Herbs	
", " Wirbelwind. Reinweiß, halbgefüllt, 60—100 cm, h ", silvestris grandiflora. Waldanemone, großblumig, rein	weiß,
30-40 cm, Mai-Juni	0.50

Aquilegia chrysantha, Akelei. Goldgelb, 60-70 cm, Juni-Juli	St. M.
Aquilegia chrysantha, Akelei. Goldgelb, 00-70 cm, Juni-Juli	
" coerulea hybrida. Blau, lila, rosa, 60—70 cm, Mai-Juni	0.50
", coerulea hybrida. Blau, IIIa, rosa, 60—70 cm, Mai-Juni	0.50
	0.50
vulgaris hybrida. Weiß, lila, rosa, purpurn, 60 – 80 cm, Juni-Juli .	0 40
	0.80
" californica. Sehr dekorotive Blattpflanze, 200 cm, September .	1
Artemisia vulgaris alba (syn. lactiflora). Edelraute, milchweiß, 100—150 cm, August—September	0.60
Aruncus silvestre var. Kneiffii. Geißbart (syn. Spiraea aruncus). Weiß,	0.00
	1.25
Frühjahrs-Astern:	
Aster alpinus. Siehe unter Abteilung C hinten.	
" subcoeruleus. Hell- und dunkel-violett. 40—50 cm, Mai—Juni	0.50
Sommerblühende Stauden-Astern:	
	0.60
Aster amellus. Neuere Sorten siehe unter Abteilung A vorn.  Framfieldii. Leuchtend stahlblau, 50 cm, August-September	0.80
" Imperator. Dunkel lavendelblau, 50 - 60 cm, AugSeptember	1
" Leuchtfeuer. Lilarot, 50 cm, August-September	2
" Otto Rudolf. Langstielig, dunkellila, 60-70 cm, Septbr.	0.80
" Schöne v. Ronsdorf. Sehr großbl., lilarosa, 50 cm, AugSept.	1.50
" Stella. Purpurblau, 40-50 cm, September-Oktober	0.80
"  Ultramarin. Dunkelultramarin, 60 cm, September-Oktober  Wienholzi. Leuchtend rosa, 50—60 cm, August	0.00
" ptarmicoides. Kleinblumig, weiß, 40-50 cm, August	
Herbstblühende Staudenastern (großblumige): Aster novi-belgii:	
	0.70
Genoveva. (H. J.). Weiß, eigenartig schön, 1 m, September	0.60
	0.50
Lavendel. Lavendelblau, großblumig, 1 m, September-Oktober	0.60
Loreley. (H. J.). Sehr großblumig, reinweiß, 80 cm, September-Oktober	0.00
Massliebchen. (H. J.). Rosa, halbgefüllt, 1 m, Oktober	11 51
Peggy Rellard Lightlile halboefüllt I m	
FEGURA BUILDING, LICHTING, HOLDGETUIL, I III	0.60
Proserpine. Dunkel lavendelblou, 120—150 cm, September	0.60
Proserpine. Dunkel lavendelblou, 120—150 cm, September	0.60 0.70 0.50
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September	0.60 0.70 0.50 0.50
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September	0.60 0.70 0.50 0.50
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September	0.60 0.70 0.50 0.50
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern: Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50
Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  " Sprühlicht. Weißlich lila, 60—100 cm, Oktober-November	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.70
Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  "" Sprühlicht. Weißlich lila, 60—100 cm, Oktober-November	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.70
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  " Sprühlicht. Weißlich lila, 60—100 cm, Oktober-November	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.70
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  "" Sprühlicht. Weißlich Iila, 60—100 cm, Oktober-November  "" ericoides. Weiß, 1 m, September-Oktober  Andere Herbstastern:  Aster laevis. Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.70 0.70 0.40
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  "" Sprühlicht. Weißlich Iila, 60—100 cm, Oktober-November  "" ericoides. Weiß, 1 m, September-Oktober  Andere Herbstastern:  Aster laevis. Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.70 0.70 0.40
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  Sprühlicht. Weißlich Iila, 60—100 cm, Oktober-November  ericoides. Weiß, 1 m, September-Oktober  Andere Herbstastern:  Aster laevis. Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November  novae angliae Constanze. Violettblau, 150 cm, Oktober  Lill Fardell. Karminrosa, 150 cm, Oktober	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.70 0.70 0.70 0.7
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  """ Sprühlicht. Weißlich Iila, 60—100 cm, Oktober-November  """ ericoides. Weiß, 1 m, September-Oktober  Andere Herbstastern:  Aster laevis. Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November  "" novae angliae Constanze. Violettblau, 150 cm, Oktober  "" "" Lill Fardell. Karminrosa, 150 cm, Oktober  "" "" pulcherrimus. Licht lila, großblumig, 150 cm, Oktober	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.70 0.70 0.40
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  Sprühlicht. Weißlich Iila, 60—100 cm, Oktober-November  ericoides. Weiß, 1 m, September-Oktober  Andere Herbstastern:  Aster laevis. Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November  novae angliae Constanze. Violettblau, 150 cm, Oktober  """  """  """  Lill Fardell. Karminrosa, 150 cm, Oktober  """  pulcherrimus. Licht Iila, großblumig, 150 cm, Oktober  albus. (H. J.). Weiß, großblumig, 150 cm, Oktober	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  """ Sprühlicht. Weißlich Iila, 60—100 cm, Oktober-November  """ ericoides. Weiß, 1 m, September-Oktober  Andere Herbstastern:  Aster laevis. Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November  "" novae angliae Constanze. Violettblau, 150 cm, Oktober  "" "" Lill Fardell. Karminrosa, 150 cm, Oktober  "" "" pulcherrimus. Licht lila, großblumig, 150 cm, Oktober	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  Sprühlicht. Weißlich Iila, 60—100 cm, Oktober-November  ericoides. Weiß, 1 m, September-Oktober  Andere Herbstastern:  Aster laevis. Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November  novae angliae Constanze. Violettblau, 150 cm, Oktober  """  """  """  Lill Fardell. Karminrosa, 150 cm, Oktober  """  pulcherrimus. Licht Iila, großblumig, 150 cm, Oktober  albus. (H. J.). Weiß, großblumig, 150 cm, Oktober	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 0.60
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  Sprühlicht. Weißlich Iila, 60—100 cm, Oktober-November  ericoides. Weiß, 1 m, September-Oktober  Andere Herbstastern:  Aster laevis. Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November  novae angliae Constanze. Violettblau, 150 cm, Oktober  Lill Fardell. Karminrosa, 150 cm, Oktober  pulcherrimus. Licht Iila, großblumig, 150 cm, Oktober  albus. (H. J.). Weiß, großblumig, 150 cm, Oktober  Astilbe hybrida (Spierstaude), syn. Astilbe Arendsii  Vorzügliche Schmuck- und Schnittstauden für jeden Garten.  Neueste Sorten siehe vorne Abt. A.	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60
Schneelawine. (H. J.). Schneeweiß, 1 m, September Schön Rottraut. (H. J.). Leuchtend rosa, 1 m, September Wunderkind. (H. J.). Leuchtend indigoblau, 1 m, September-Oktober  Kleinblumige Herbstastern:  Aster cordifolius Ideal. Lila, 60—100 cm, September-Oktober  """ Sprühlicht. Weißlich lila, 60—100 cm, Oktober-November  """ ericoides. Weiß, 1 m, September-Oktober  Andere Herbstastern:  Aster laevis. Lavendelblau, 150 cm, Oktober-November  """ novae angliae Constanze. Violettblau, 150 cm, Oktober  """ Lill Fardell. Karminrosa, 150 cm, Oktober  """ pulcherrimus. Licht lila, großblumig, 150 cm, Oktober  """ albus. (H. J.). Weiß, großblumig, 150 cm, Oktober  """ Astilbe hybrida (Spierstaude), syn. Astilbe Arendsii  Vorzügliche Schmuck- und Schnittstauden für jeden Garten.	0.60 0.70 0.50 0.50 0.50 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60



Astilbe hybrida (Arendsii) »Weiße Gloria«.
Schönste aller weißblühenden Astilben.

Astilbe hy	brida (s	yn. Aren	dsii):				
Bergkris Diamant Granat. Hyazinth	<ul> <li>Schneev</li> </ul>	eeweiß, spät eiß, frühblüt dunkelkarm nd lilarosa	nend. Anf		Alle	6 Sorten 1 Stück	
Ceres. Gloria. Gunther Juno. L. Kriemhil Lachskör Opal. L. Siegfrie Vesta. Walküre Astilbe Davi	Lilarosa, 60 Leuchtend Leuchtend Leuchtend Leuchtend Lochs  Ide. Lachs  Ide. L	rosa mit licht dunkelrosa, d hellrosa, 8 urpurrosa, 80 rosa, 80 cm, chsrosa, gepe a, Juli-August carminrosa, 8 a, 80 cm, Juli- h-lila, 150 cm h-lila, 150 cm	gust 50-60 cm 80 cm, Juli 0-100 cm, August erlt, 80 cm, B0 cm, Aug li-August Juli-August cm, Juli	, Juli August August Juli-Augus	Alle	Sorten 1 Stück	0.60
Astilbe Taqu lilarosa Astrantia m Bergenia (sy	Farbe, 60- ajor. Ste	-80 cm, Aug	gust . a geaderte	Hüllblättch	en, 80 cm,	Juni-Juli	0.70
	März-April racheyi a	lba. Weiß,	25 cm, A				1.—
Boltonia lat Caltha palu Campanula	isquama stris fl. pl glomerat	(syn. Diplos Dotterblur a superba. ia alba gra coerulea Moerhei Die Fee.	tephium). me, goldge Tiefblau, andiflora. grandifl mii. Weiß Hellblaue	lb, gefüllt, 50 cm, Jur	30 cm, Ma ni-Juli 60 cm, J olumig, bla 60 cm, ume, 506	i Juni u, 50—60 Juni 0 cm, Juni	0.50 0.70 0.60 0.50 0.50 0.80 0.70 0.80

Centaure	montana grdfl. Blau, 40—50 cm, Mai ,, alba. Weiße Bergkornblume, 40—50 cm, macrocephala. Gelb, 100-120 cm, Juni-Juli, wertvolle S pulcherrima (syn. Aetheopappus). Kaukasus-Kornl	chnif	tblu	me	0.50 0.50 0.70
	60—80 cm, Juli			4	0.70
"	ruthenica. Schwefelgelb, 150 cm, Juni-Juli	A		*	0.60
	obliqua alba. (Bartfaden.) Weiß, 50 cm, Juli-August			*	0.60



Eine Gruppe blühender Freiland-Chrysanthemum in meinem Schaugarten.

Chrysanthemum indicum flore pleno. Winterharte Gartenchrysanthemum, prachtvalle Schnitt- u. Schmuckstauden. Blütezeit Sept.-Okt., oft auch bis November. Bei Herbstpflanzung sind die Pflanzen leicht zu decken.

Altgold (Pompon). Prachtvolle Gruppensorte, gold-bronzegelb, 50 cm Anastasia (Pompon). Reichblühende, dunkelkarminrasa Gruppensorte, 50 cm Belle mauve. Silberlila, großblumig, 80 cm

Black Douglas. Spätblühend, dunkelsamtrot, 50 cm

Climax. Leuchtend kanariengelb, Schnitt- und Gruppensorte, 50 cm

Dainty. Mittelgroße Blume, dunkelrosa, 70 cm

Edelstein. Mittelgroß, weiß

Goldperle (Pompon). Goldbraun, mittelfrüh, 70 cm La Triomphante. Rosa, langstielige Massenschnittsorte

Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß, großblumig.

Mägdeblick. Mittelfrüh, samtigrotbraun. Vorzügliche wetterharte Sorte

Normandie. Reichblühend; wertvollste rosablühende Sorte, 80 cm

Normandie, eigener Sport, bronzefarbig. Besitzt alle Vorzüge der Stammsorte

Pluie d'argent. Frühblühend, reinweiß, 50 cm

Purpur. Reichblühend, vorzüglich zum Schnitt, purpurn, 80 cm

Ruby King. Sammet rotbraun, 60 cm Satin rose. Kräftig rosa, großblumig, 70 cm, spätblühend Source d'or. Goldbronzefarbig, 80 cm. Vorzügliche Sorte Toulousaine (Pompon). Reichblühend, rotbraun, 60 cm

White Croutts (Pompon). Reinweiß, 50 cm

Zwergsonne (Pompon). Leuchtend gelber Sport v. »Altgold«. Sehr wertvoll, 50 cm

Alle Sorten je Stück: Starke Pflanzen 0.70, Junge Pflanzen 0.40

		1 St. M.
Chrysanthemum	(syn. Leucanthemum) maximum (Wucherblume) Triumph. Reinweiß, 60 cm, Juli-August	0.60
"	maximum Hildegard v. Grüter. Riesenblumig, meterhoch.	63.5
	Vorzügliche Schnittsorte.  maximum King Edward VII. Reinweiß, 80 cm, Juli-August	0.70
"	maximum Ophelia. Rahmfarben. Sehr schön	1
Cimicifuga japon	ica (Actaea). Weiß, 1 m, August-September	0.80
" racen	nosa. Weiß, 120—150 cm, Juli-August	0.80
Clematis (Waldreb	e) heracleaefolia var. Davidiana. Hellblaue Hyacinthen-	
1	n-Blüten, 80 - 100 cm, August	1.50
" recta fl.	Weiß, 1 m, Juni-Juli	2
Diese	3 Clematis sind keine Schlingpflanzen!	
Coreopsis (Mädch	iflora siehe Polygonatum multiflorum! enauge) grandiflora. Goldgelb, 60—80 cm, Juli-Okt.	0.40
" verticil	llata. Hellgelb, 50 cm, Juli-Oktober	0.60
	uenschuh) calceolus. Rotbraun mit Gelb, 40 cm, Mai-Juni	1.00
Delphinium hy Neuheiten siehe	vorn unter Abt. A.	
	klin. Enzianblaue Belladonna-Hybride, 120 cm, Juli	1
	Weißer Belladonna-Sport	0.70
Wilh. Storr.	Himmelblau mit rosa Schattierung, einfach	0.80
	en. Dunkelblau, gefüllt	0.50
Gemischte	Hybriden, gefüllte in prächtigem Farbenspiel	1
Dictamnus albus	(Diptam). Weiß, 60-80 cm, Juni	0.80
Dicentra spectab	var. rubra. Rosenrot, 60—80 cm, Juni ilis (syn. Dielytra). (Tränendes Herz.) Rosa, 60—80 cm,	0.80
Mai-Juni		0.70
100-150 cm	a var. gloxiniaeflora. (Fingerhut.) Weiß, rosa, rot,	0.50
Diplostephium sie	sicum. Goldgelb, 40 cm, April	0.50
,, plant	agineum excelsum. (Gemswurz.) Gelb, 80 cm, April-Mai	0.50
	rea siehe Rudbeckia! geldistel). Blau, 150 cm, Juni-Juli	0.60
" sphaero	cephalus. Grauweiß. 150 cm, Juni-Juli	0.60
	mesagrande speciosus. Tiefblau, 50 cm, Juli-Septbr.	0.60
	is grandiflorus hybr. Hell- u. dunkellila, 50 cm, Juni-August	
	delblau, 50 cm, Juni-Juli	0.60
" superbu	s major. Hell lila, großblumig, 60 cm, Juli-September .	0.60
Eryngium alpinu	m (Edeldistel). Silberblau, 50-80 cm, Juni-Juli	0.80
nlanun	n. Stahlblau, 1 m, Juli-August	0.80
	. Juwel. Dunkelstahlblaue Blütenstände	0.80
Fundtorium nurn	Violetta. Blütenstände rötlich-violett  ureum (Walddost). Purpurrosa, 1½—2 m, Juli-August	0.80
	milch) epithymoides (syn. polychroma). Leuchtend gold-	
Filipendula hexa	petala (Spierstaude) (syn. Spiraea filipendula fl. pl.). Weiß	
" palm	ata elegans (syn. Spiraea palmata). Zart rosa, 80 cm,	0.00
laveri la		0.70
level le		0.60
Funkia siehe Hos	ta.	
	denblume) aristata hybrida (syn. G. grandiflora). Gelb errlichstem Farbenspiel, 50—60 cm, Juni-Oktober	0.50
Galega bicolor I	Hartlandii (Gaisraute). Reizende lila und weiße Schmetter-	
Geranium iboria	00 cm, Juni-August	0.70
	uli	0.60

			1 St. M.
		aw. Scharlach, 50 cm, Juni-Sept.	0.50
		m. Hellorange, 60 cm, Mai-Juni . von riesigen Ausmaßen, Verlangt	0.60
reichl	ich Wasser im Sommer, im Winter	dagegen Trockenheit und Deckung.	
Je no	och Größe	ol. Echt, weiß gef., 1 m, Juli-Aug.	5
Harpaliun	n siehe Helianthus.	I. Echt, wells get., I m, Juli-Aug.	1.
	(Sonnenbraut) autumnale Ga	rtensonne. Goldgelb, 150 cm,	
	August-September		0.60
"	braunroter Schattierung, 1 m, Jul	Julisonne. (H. J.) Goldgelb mit	0.60
"	autumnale pumilum magnific	cum. Goldgelb, 60 cm, Juli-Sept.	0.40
**	Bigelowii. Goldgelb mit schwar	rzer Mitte, 80 cm, Juni	0.60
"	Hoopesii. Oronge. 60 cm, Ma hybridum Goldene Jugend si		0.50
	hybridum Wesergold siehe ur	nter Neuheiten.	
Helianthu	s rigidus (syn. Harpalium) Danie	Dewar. Goldgelb, 1 m. Juli-Sept.	0.50
Unlianthu	Schlonke Sonnent	l. Hellgelb, 150 cm, Juli Sept Jume mit weidenartig hängenden,	0.50
lanze	ttlichen Blättern und kleinen gel	ben Blütchen, 1—2 m, Oktober.	
Präch	tige Schmuckstaude für Einzelstellu	ing	0.70
Helleboru	s hybridus (Nieswurz). Rosa-pur		0.90
"	niger (Christrose). Weiß, 30 c	ann. Rosa mit purpurn. Punkt , Febr. m. Dezember-März	1.20
"	" major. Weiß, größer,	30 cm, Dezember-März	2
"	praecox. Weiß, 40 cm	, Oktober-Dezember	3
	illis (Taglilie) aurantiaca. Echt, citrina. Zitronengelb, süß d	orange, 75 cm, Juli-August	1.20
"	Dumortieri. Orangegelb, 5	0 cm, Mai-Juni	0.60
"	flava. Goldgelb, 70-80 cm	n, Mai-Juni	0.50
"	fulva. Orange, 75 cm, Juli	the state of the s	0.50
"	hybr. Aureole. Großblumig	Orange, gefüllt, 80 cm, August g, dunkelorange, 80 cm, Juli	0.60
"	Middendorffii. Orangegelb	, 50 cm, Mai-Juni	0.60
	n (Bärenklau) Mantegazzianum. brizoides gracillima superba		0.80
meuchera "	50 cm, Juni-Juli	(Furpurgiockchen), Rose, Liente	0.70
"	sanguinea alba. Weißblühend	le Abart von H. sanguinea. Juli	0.70
"	sanguinea maxima. Scharlach	chtend scharlach, 40 cm	0.70
"	" Morgenröte. Rosa		0.70
"	rubescens. Weißlich-rosa, 60 -	80 cm	0.70
Harte Jeve	Hybriden in schönstem Forbensp		0.50
" Fort	Funkia (Funkie) Fortunei glauce funei robusta. Stahlblaue Belau	hung, starkwachsend, 50 cm, Juli	0.80
" ova	ta albo-marginata. Weißberg	indete Belaubung, 30 cm	0.60
" ova	ta aureo-variegata. Goldbunt		0.50
- h	usta elegans fol. var. Kräftige	ubung, Blüte lila, 25 cm, Juni-Juli er als vorige, 40 cm	0.60
	oldiana hybrida. Lila, 50 cm,		0.70
Hypericun	calycinum (Hartheu). Gelb, g	roßblumig, 40 cm, Juni-September	0.70
Incarvilled	(Staudengloxinie) Delavayi. K	arminrosa, 70 cm, Mai-Juni	0.80
	n, Mai-Juni	oßen orangegelben Strahlenblüten	0.60
Inula (Alar	nt) Royleana. Orangegelb mit s		1
Iris (Schwei	rtlilie) germanica:	Donna Maria. Lichtlila-weiß	
Darie	us. Chromgelb mit lila . Hellblau	Dr. Bernice. Purpur und oran Her Maiesty. Nelkenrosa	ige
	ntina. Perlmutterfarbig	Her Majesty. Nelkenrosa Homer. Lavendelblau	
Hect	or. Hell kupferforbig	Iriskönig. Goldgelb und brau	unrot
	Gray. Kupferfarbig	Mad. Chereau. Weißu.lavende	lblau
(VILLE)	ri King. Gelb mit braunrot ras. Lichtgelb mit purpur	Mad. Paquette. Purpurrosa Mad. Patti. Lichtgelb und vio	lett
Mith		Prinzess Viktoria Luise. Schw	vefel-
Mith Mrs.	H. Darwin. Weiß, tila geadert		The second second
Mrs. Mrs.	Reuthe. Weiß, bläulich geadert	gelb und pflaumfa	
Mith Mrs. Mrs. Palli		Rheinnixe. Weiß und veilchen Riese von Cönnern. Hellblau	nblau

Iris	Halfd	an. Hell c	and the second s	1St. M. 50 cm hoch, blühen gleich nach Iris pumila. Ingeborg. Weiß   Nebenstehende Walhalla. Lila   4 Sorten je 0.50	
Iris	pumila	(Zwerg-Iris)	coerulea.	Hellblau, April-Mai, 20 cm 0.40	
**	"		Die Braut.	(H. J.) Reinweiß, 35 cm 0.50	
"	"	"	Die Fee.	H. J.) Dunkel veilchenblau, 35 cm 0.50	
				Ockergelb, 30 cm 0.50	




Gruppe riesenblumiger **Iris Kaempferi** (japanische Schwertlilien) in den Anlagen meiner Gärtnerei. Prachtvolle eigene Züchtungen, 1 St. 1.50 M., 10 St. 14. – M. Uebrige Sorten siehe weiter unten!

### Verschiedene Iris-Arten und Hybriden.

그는 그는 그 전에 가는 사람들이 살아보면 하면 하는데 얼마나 나는 그들은 것이 되었다. 그는 그들은 그는 그는 그는 그를 모르는 것이다. 그는 그를 모르는 것이다.	100
	0.80
	0.80
	0.80
	0.80
Iris Kaempferi (japanische Pracht-Schwertlilien).	
Prachtvolle japanische Sorten in allen Farben, 50—100 cm hoch, Juli . 1	1.20
	0.80
	0.80
Snow Queen Schoenweiß I m luni luli	0.50
mailtide contempts Doublettie Dista ballion for an inci-	1.50
,, palida variegara. Buntolarrig, Blure nelibiau, 50 cm, juni	
	0.40
0.7.1	2.50
	0.70
	0.70
Kniphofia (syn. Tritoma) (Fackellilie) uvaria grandiflora. Korallrote Blüten-	
fackeln, 1 m, August-September. Verlangt Winterschutz	0.80
Lavandula (Lavendel) siehe unter Abt. C.	
Leucanthemum maximum siehe Chrysanthemum maximum.	
	08.0
	0.50
Lilium regale siehe unter Abt. A.	1.00
Linum narbonnense. Niedriger, buschige Pflanzen bildender Lein, den ganzen	
Sommer mit hellblauen Blüten geziert. Belaubung nadelartig, blaugrün.	
	1
Lupinus (Lupine) polyphyllus. Blau, 1 m, Juni-August	0.50
,, albus. Weiß, 1 m, Juni-August (	0.50
" albus. Weiß, 1 m, Juni-August	).70
Lychnis chalcedonica (Brennende Liebe). Scharlach, 1 m, Juni-Juli	0.50
alba Abart mit weißen Blüten	0.50
" viscaria splendens fl. pl. Gef. Pechnelke, siehe Viscaria viscosa fl. pl.	-
// Tracarra perenauna in più comi como mo, siene viscosa in più	

	1 St. M.
Lythrum virgatum Rose Queen (Weiderich). Zur Bepflanzung von Ufern und für Rabatten. Schlanker, zierlicher Wuchs. Lachsrosa Blüten, 80—100 cm	0.50
Juli-September	0.50
Macleya cordata (syn. Bocconia japonica). Federmohn. Herrliche Blatt- und Dekorationsstaude. Blüten weiß. 2—3 m hoch. Juli-August	0.70
Megasia (Bergenie) siehe Bergenia.  Monarda didyma (syn. Kalmiana). Bienenbalsam. Violettrot, 60—80 cm .  Cambridge Scarlet. Scharlachrot, 80 cm. Mai-Sept  var. salmonea. Lachsrosa, 60 – 80 cm	0.60 0.60 0.60
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht). 30 cm. Mai-	
September . Oenothera (Nachtkerze) glauca (syn. glabra). Goldgelb, 40 cm. Juni-Juli .	0.40
" missouriensis (syn. macrocarpa). Großblumig, leuchtend gold-	27.2
Onopordon (Anatoldistel) bracteatum. Silberweiße Belaubung, Blüten pur-	0.60
purn, 2 m, August-September, zweijährig	0.50
Paeonia albiflora sinensis fl. pl. (Gefüllte Pfingstrosen). 60-100 cm, Mai-Juni	12.14.14
Alba magna rosea. Rosa, Spitzen weiß	1
Albiflora splendida. Fleischfarben, innen gelblich	1.20
Bicolor. Außen mattrosa, innen cremefarben	1.20
Buykii. Nelkenform, zartrosa, Mitte lachsforben	1.20
Clarissa. Schale rosa, Füllung silbrigrosa	2
Duchesse de Nemours. Weiß mit hellschwefelgelber Füllung	2
Festiva maxima. Reinweiß mit elfenbein Untergrund, Mitte karmin .	2
Humei carnea. Atlasrosa, riesenblumig	1.50
Jeanne d'Arc. Pfirsichblüten mit orangegelber Füllung	2.50
Lilacina superba. Leuchtend lilarosa	1.20
Mad.Charles Lévêque. Zart fleischfarbig, Nelkenform. Duftend	1.50
Mad. Forel. Seidenrosa mit lila Schein  Nivea grandiflora. Fleischfarben mit weißer Füllung  Prinzess Charlotte. Zastsosa spätblübend	1.50
Nivea grandiflora. Fleischfarben mit weißer Füllung	1.50
Frinzess Charlotte, Zomosa, sparblunena	1122
Princesse de Galitzin, Hellrosa, Mitte gelblich	1.20
Prolifera tricolor. Weiß, gelb und rosa Füllung	2.50
Reine des fleurs. Lilarosa, Füllung chamois	1.50
Reine des Roses. Rosa, Mitte gelblich schattiert	2
Rubra Triumphans. Tief dunkelrot	1.50
FREE TEACHER TO A TOTAL TO A TOTA	1.50



Einzelblüten von Paeonia Mad. Charles Lévêque. Eine der schönsten Pfingstrosen.

Paeonia albiflora									ai-Jun	ii	
Triumphans	ganday	ensis.	Zart lila,	hellgelb	und	lad	hsfar	ben			2
Versicolor.	Rosa mit	weiß	nuanciert						4		1.20

	1 Sr. M.
Paeonia albiflora sinensis fl. pl.	
Victoire de l'Alma. Purpurviolett	2
Ville de Poissy. Zart lilarosa, Mitte Zoë Calot. Dichtgefüllt, zartrosa, M	e gelblich 1.20 Nitte gelblich 1.50
Paeonia, einfachblühende, in Sorten:	inte gelolici
will loans Calastial I and the	purpurrosa 1.—
nurpured Dunkelou	rourret 1-
" anemonaeflora. Tief purpurn	, halbaefüllt bis gefüllt 1.50
" Wittmanniana hybrida. Flei	ischfarbig rosa bis hellockergelb . 1.50
,, officinalis alba plena. Reinw	eiß, gef. Abart der alten Bauernrose 2.—
Papaver nudicaule (Sibirischer Mohn) Sur wachsende, großblumige, engl. Rass	se. Weiß, gelb orange und rot,
,, orientale (Türkischer Mohn) in b Neue Sorten siehe unter Ab	pesten Sorten, 60—100 cm, Mai-Juli:
	zess Viktoria Luise, lachsrosa ) alle Sorten
	ttembergia, dunkelblutrot   je St. 0.60
	(BEECH) - BET - TOTAL - TOTAL CONTROL OF THE STREET OF TH
Peltiphyllum peltatum (syn. Saxifraga steinbrech. Prächtige Blattpflanze für	Uferpartien, mit rosa Blütenrispen,
40-70 cm, Mai	-h- Ahi C histor
Phlox (Flammenblume). Frühjahrsblüher sie " Arendsii. Bastarde in besten Sorter	
14 3 4 4 40 50	0.70
Phlox paniculata (syn. decussata). Folgende beste ältere und neuere Sorten	Neuheiten siehe vorn unter A. sind abgebbar, jede Sorte ohne
Preisangabe	0.50
Andenken an Wilhelm Pfitzer	Hanny Pfleiderer. Rahmweißm. karmin
Antoine Mercier. Weiß mit lila Auge,	Hans Vollmöller. Lila mit weißer
70 cm Baron van Dedem. Große Dolden	Mitte, 60 cm
scharlach-blutroter Blüten	Hindenburg. Feurigkarmesinrot, niedrig Le Mahdi. Veilchenblau, 70 cm
Deutschland. Karmin mit dunkelrosa	Loki. Lachsrosa mit Karmin, 80 cm
Auge 0.60	Riga. Hellkarmin, Mitte weiß, 80 cm
Dr. Königshöfer. Orangescharlach	Rijnstroom (Rheinstrom). Dklrosa, 80cm
mit dunklem Auge 0.80	Sieger. Karminrosa, 70 cm
Elisabeth Campbell. Lachsrosa, 60 cm	Sommerkleid. Weiß m.rot. Auge, 70 cm
Fellbacher Porzellan, niedr. für Gruppen 1.—	Victor Stössel. Karmin mit dunklem Auge, 70 cm
Frl. v. Lassberg. Schneeweiß, 70 cm	Wala. Blendend weiß, 50 cm
Garteninspektor Krauss. Reinlila,	Württembergia. Niedrig, leuchtend,
60 cm	karminrosa
Phlox maculata hybr. Alpha. Mittelho	
Lilarosa mit dunklem Auge, 1 m	n, Juli-August 0.50
" suffruticosa Snowdon. Schneewe	eiß, 50 cm, Mai-Juli 0.50
Physalis Franchetii (Judenkirsche), Rote	
Physostegia (Staudenheide) virginiana c 80 cm	0.50
,, virginiana grdfl. alba. W	
Phytolacca decandra (Kermesbeere). W	eiß, mit Rispen schwarzer Beeren-
früchte an rötlichen Stielen, 100-150 a	cm, Juli-August 0.80
Platycodon grandiflorum Mariesii (sy	n. Wahlenbergia). Mit großen
schalenförmigen, dunkelblauen Glocke	
Polemonium (Himmelsleiter) Richardsoni	i. Himmelblau, 40 cm, April-August 0.60 album. Reinweiß, 40 cm,
"	
	n. Salomons-Siegel. Schöne Halb-
April-August	
April-August Polygonatum (Convallaria) multiflorun	ten menden bieren, be ein, mer jem er
April-August  Polygonatum (Convallaria) multiflorum schattenpflanze mit hängenden, grünli Polygonum alpinum (Knöterich). Weiß,	50 cm, Juni 0.70
April-August  Polygonatum (Convallaria) multiflorum schattenpflanze mit hängenden, grünli Polygonum alpinum (Knöterich). Weiß, bistorta. Rosa, 60 cm, Juni	50 cm, Juni 0.70
April-August  Polygonatum (Convallaria) multiflorum schattenpflanze mit hängenden, grünli Polygonum alpinum (Knöterich). Weiß, bistorta. Rosa, 60 cm, Juni polystachium. Rosa-weiß, 1	50 cm, Juni
April-August  Polygonatum (Convallaria) multiflorum schattenpflanze mit hängenden, grünli Polygonum alpinum (Knöterich). Weiß, " bistorta. Rosa, 60 cm, Juni " polystachium. Rosa-weiß, 1 Potentilla (Fingerkraut) hybrida fl. pl.	50 cm, Juni 0.70
April-August  Polygonatum (Convallaria) multiflorum schattenpflanze mit hängenden, grünli Polygonum alpinum (Knöterich). Weiß, bistorta. Rosa, 60 cm, Juni polystachium. Rosa-weiß, 1 polystachium. Rosa-weiß, 1 gelb, orange bis tief mahagonifarben	50 cm, Juni 0.70 0.50 50 cm, September-Oktober 0.60 Gefüllt blühende Prachthybriden in n, 40-50 cm, Juni-Juli, in folgenden
April-August  Polygonatum (Convallaria) multiflorum schattenpflanze mit hängenden, grünli Polygonum alpinum (Knöterich). Weiß, bistorta. Rosa, 60 cm, Juni polystachium. Rosa-weiß, 1 polystachium. Rosa-weiß, 1 gelb, orange bis tief mahagonifarben Sorten: Wm. Rollisson, Vulcain, E.	50 cm, Juni
April-August  Polygonatum (Convallaria) multiflorum schattenpflanze mit hängenden, grünli Polygonum alpinum (Knöterich). Weiß, "bistorta. Rosa, 60 cm, Juni "polystachium. Rosa-weiß, 1 Potentilla (Fingerkraut) hybrida fl. pl. gelb, orange bis tief mahagonifarben	50 cm, Juni

Andrew Uni	W. C. J			1.0							1 St. M.
Primula		Orangegelb				4					0.70
"		<ul> <li>Hamelner</li> </ul>						piel		-	0.80
**	denticulate	. Violett, 30	cm, April-	Mai, Ko	pfpri	mel		*			0.40
**	"		eiß, 30 cm								0.50
"	"		iana. Bla	uviolett,	wei	13 1	pesta	ubt,	30	cm,	010
	Importer	April-Mai	m Mai Luni		4			*			0.60
. "		Karmin, 50 c				*		*	*		0.60
		ten siehe Abt	100								
Pyrethru	hende bes	hybridum ( ste Sorten in we i-Juli und Sep	eiß, rosa, kar	min, blu	trot,	lila,	lilaro	sa, c	gelbl	ich-	
Du	ke of York	<ul> <li>Dunkelblutr</li> </ul>	ot, anemon	enblütig				*			0.80
G.	T. Watkins	. (H. J.) Kar	minrot, gef	üllt .		+		4			0.80
		(H. J.) Karm			lütig			*			0.80
		<ul> <li>y. Einfach, d</li> </ul>						-		4	0.80
		Einfach, leuch									0.80
		a. Zartrosa,			40	4		*		4	0.80
		Bblumig einfo				4.		4			0.80
		ry. Dunkelbl			4.	*		*	1.61	*	1
Gu	een mary.	Zartrosa, ge	tullt .	enn.			*	*	+		1
		ux. Elfenbeir			*					. :	1
Rodgers	ia (Schaubla podoph	anguticum (2 itt) aesculifo ylla. Grünlic	lia. Rosaw hweiß, 1 m,	eiß, 1 r Mai-Ju	n, Ju	ni-J	uli				1.20 1.20
Rudbeck		t) laciniata G									0.40
**	nitida H	lerbstsonne.	Goldgelb	1.50-	2 m,	Se	premi	er-C	Okto	ber	
**	purpure	a (Echinacea	Stachelko	pr). Ko	sarot	, 15	U cm,	Juli	-Aug	just	0.80
"	"	perfecta.				1.4		in	in	-	1,-
	Juli-Se	syn. Newm ptember									0.50
		Bbl., Salbeia	rt mit hellt	plauen l	ippe	nbli	iten,	30-	-00	cm,	0.70
Saxifrag		siehe Peltipl				*			-	- 4:	0.70
Scabiose	(Skabiose)	caucasica.	alba. W				uli	*	-		0.70



Niedrige und halbhohe Blütenstauden im halbschattigen Felsengarten meiner Anlagen.

			1 St. M.
Sedum spectabile (Fetthenne). Violettrosa, 40 cm, September .			0.40
" atropurpureum. Purpurkarmin, 40 cm, Septem			0.50
" Brillant. Dunkelrot, sonst wie vorige			0.60
Senecio clivorum Orange Queen (Kreuzkraut). Leuchtend orange	gelb		
150 cm, Juli-Aug. Für feuchte Stellen und Uferbepf			1
" Othello. Blüten dunkelorange, Blätter beim Aust			
dunkelpurpur, spöter schwarzgrün. 100-120 cm,	uli-A	lug.	1
(Zwei prächtige Dekorationsstauden.)			
Solidago (Goldrute) rugosa (syn. aspera). Feinverzweigt, goldgelb,	120	cm	
August-September			0.50
,, Gattingeri. Hellgelb, 80 cm, September-Oktober			0.50
" Shortii, Goldgelb, 150 cm, August-September			0.50
" virgaurea nana. Goldgelb, 40 cm, August-Oktober .			0.50
neue Sorten siehe vorne unter A.			
Spiraea (Spierstaude) Aruncus Kneiffii siehe Aruncus silvestre.			
" filipendula fl. pl.			
" palmata elegans siehe unter Filipendula!			
" vimaria n. pi.			
venusta	Min		
Thalictrum (Wiesenraute) minus var. adiantifolium. Gelblich,	Bla		010
adiantumähnlich, 70 cm, Juni			0.60
" aquilegifolium. Weiß bis purpurviolett, 80 cm, Juni-Jul			0.70
" dipterocarpum. Purpurrosa, 1 m, Juli-August			
			0.70
Tritoma siehe Kniphofia!			
Trollius (Trollblume). 40-70 cm, April-Mai blühend.			0.00
" caucasicus Orange Globe. Großblumig orange	*		0.80
" hybridus Canarybird. Kanariengelb, 50 cm			0.00
" Caldest of All. Orangegelb, frun	*		1.20
" Goldquelle. Grobblumig, gelborange			1.20
" Goliath. Golagelb, noch	*		1
" Helios. Keingelb	*		1
Earliest of All. Orangegelb, früh Goldquelle. Großblumig, gelborange Goliath. Goldgelb, hoch Helios. Reingelb Lichtball. Großblütig, orangegelb Newry Giant. Hellgelb, 60 cm, spätblühend	*		1.50
" Newry Glant. Heligelb, ou cm, sporbluhend .	*	+	1.30
Orangekönig. Leuchtend orange praecox. Neue, frühblühende Hybriden eigener 2	2.50		1.20
" praecox. Neue, frunblunende hybriden eigener Z	uchti	ung	0.70
" Hamelner Hybriden, in prächtigem Farbenspiel	-		0.70



Trollius hybridus in meinem Schaugarten.

			1.5	St. M.
Veratrum nigrum (Schwarzer Germer). Dunke	lpurpur, 1 m,	Juli	1	1
Viscaria viscosa splendens fl. pl. (Lychnis Pechnelke, magentarot, 30 cm, Mai—Juni	viscaria). G	efüllt blüh		0.50
Yucca filamentosa (Palmlilie). Weiße Glocken, pflanze mit pyramidalen Blütenschäften	1 m, August.	Prächtige Ei		1.50



Blühende Cyclamen europaeum im schattigen Felsengarten meiner Gärtnerei.

# C. Niedrig bleibende Stauden

für Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.

#### Felsenstauden für Trockenmauern, Grotten usw.

Acaena (Stachelnüßchen) microphylla. Kriechend, bräunliche Belaubung, purpurne Samenköpfchen, 10 cm, August	0.40 0.40
Acantholimon glumaceum (Statice Ararati). Igelpolster, rosenrot, 15 cm, Juli Achillea (Schafgarbe) tomentosa. Goldgelb, Juli, 20 cm, graugrüne Belaubung Ajuga (Günsel) reptans fol. multicoloris. Blau, Mai, 10 cm, kriechend, Be-	0.80
laubung rotbraun und gelb gefleckt	0.40
Alyssum Moellendorfianum. Kriechender Steinrich, mit silbergrauen Blättchen und gelben Blüten. 10 cm, Mai-Juni	0.50 0.50 0.30 0.40 0.50
Arabis (Gänsekresse) alpina. Weiß, 30 cm, März-April	0.30 0.40 0.40
Arenaria grandiflora (Sandkraut). Niedrige moosartige Polster mit weißen Blütchen im Juli. 10 cm	0.50
Mai-Juni. 10 cm	0.50
Armeria (Grasnelke) maritima var. Laucheana (splendens). Rosenrot, 15 cm, Polster, Mai-August	0.30
" maritima alba. Niedrig, mit reinweißen Blütenköpfchen, 10 cm, Mai-August	0.30
" hybr. Schöne von Fellbach. Lilarosa, 20 cm, Juni-Juli	0.40
Asarum europaeum (Haselwurz). Kriechend, immergrüne Schattenpflanze . Asperula odorata (Waldmeister). Weiß, 20 cm, Mai	0.40

15	t. M.
	0.40
	0.50
	0.50
	0.60
	0.60
	.50
" Leichtlinii. Rötlich, 10 cm, April	.40
	).50
	0.50
	0.50
- III : [4] [1] : [4] : [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]	).40
Alle Aubrietien sind reizende Polsterpflanzen für sonnige Stellen an Trocken- mauern usw.	
Calamintha alpina siehe Satureia!	
Caltha palustris fl. pl. siehe unter Abteilung B.	
	0.50
그 사람들은 사람들이 살아가면 하는데 그리고 있다면 하는데	0.50
	0.50
annual and the second of the s	1.60
	.50
Carlina (Silberdistel) acaulis. Silberweiß, 20 cm, Juli-September 0	0.60
Cerastium Biebersteinii (Hornkraut). Weiß, weißfilzige Polster, 20 cm, Mai-Juni 0	.40
Ceratostigma plumbaginoides (Plumbago Larpentae) Bleiwurz. Kobaltblau,	
	0.10
	1.20
Cotula squalida. Rasenbildend, 5 cm	.30
Cyclamen europaeum (Winterhartes Alpenveilchen), Rot, 15 cm, Aug-Sept.  Je nach Stärke	0.60
Dianthus caesius hybridus (Pfingstnelke). Niedrige, blaugrüne Rasen mit	
	1.50
" deltoides albus. (Felsennelke.) Weißblühende Abart der roten	50
deltaides Brillant Lockers Paren hildend m leuchtand karminroten	.50
", deltoides Brillant. Lockere Rasen bildend, m. leuchtend karminroten Blütchen, 20 cm, Juni-Juli	.50
biblioticity and John John T.	100



Teilansicht eines halbschattigen Felsengartens in den Anlagen meiner Gärtnerei.

	1 St. M.
Dianthus deltoides spiendens. Schwarzgrünes Laub mit dunkelkarminroten Blüten. Sonst wie vorige	0.50
" plumarius (Federnelke) Alpha. Weiße edle Blume	0.40
" Delicata. Cattleyenrosa, 40 cm, Mai-Juni	0.40
" Gloriosa. Nelkenrosa, 40 cm, Mai-Juni	0 40
" Göttingen. Weiß, remontierend, Juni, 30 cm	0.30
Juwel. Reinrosa, 40 cm, Mai-Juni	0.40
Dicentra (syn. Dielytra) eximia (Tränendes Herz). Rosablühend, niedrig,	0.50
April-Juli ,, formosa. Hellrosenrot, Mai-Juni, 30 cm	0.50
Dryas octopetala (Silberwurz). Weiß, 10-15 cm, Juni-August	0.80
Duchesnea indica (Indische Erdbeere). Rankend, gelb, Scheinbeere rot,	0.00
Mai-September (syn. Fragaria indica)	0.30
Epilobium (Weidenröschen) Hectori. Weiß, 5 cm, kriechend, Juni-Juli	0.40
Epimedium (Sockenblume) alpinum. Rötlich violett, 30 cm, April-Mai	0.60
,, coccineum. Rot mit weißer Zeichnung, 30 cm, April-Mai	0.60
" macranthum. Cremeweiß, 30 cm, April-Mai	0.80
,, violaceum (lilacinum). Zartlila, 20 cm, April-Mai	
" niveum. Reinweiß, 20 cm, April-Mai	0.60
,, pinnatum. Dunkelgoldgelb, 30 cm, April-Mai	0.80
" sulphureum. Schwefelgelb, 30-40 cm, April-Mai	0.60
Erigeron glabellus alpinus. Niedriges, polsterbildendes Berufskraut mit lila Sternblütchen. Juli-August, 10 cm	0.50
Festuca glauca. Blaugrüne Büsche bildend. Prächtiges Ziergras für Felsen- gärten und Einfassungen	0.30
Fragaria indica siehe Duchesnea indica!	
Gentiana acaulis (Enzian). Tiefblau, 15 cm, April-Juni	1
von leuchtend blauer Farbe mit weißem Schlund	1.20
Geranium nepalense. Niedriger Storchschnabel, mit purpurnen Blüten. Juni- August, 20 cm	0.60
Geum montanum (Nelkenwurz). Goldgelb, 10 cm, Juni-Juli	0.50
The second state and second se	0.80
Gypsophila repens rosea (Schleierkraut). Rosa, kriechend, Juni-Juli	0.50
Helianthemum (Sonnenröschen) mutabile album. Großblumig, einfach weiß	0.50
" fl. pl. (Gefüllt blühend). Gelb,	0.50
Hepatica (Leberblümchen) triloba. Blau, 15 cm, März-April	0.50



Ein Quartier mit Mauer- und Felsenstauden in meiner Gärtnerei.

	St. M.
Hypericum polyphyllum (Hartheu). Zierliche, kriechende Art mit goldgelben	
	0.50
" repens. Kräftiger wachsend, sonst wie vorige	0.50
Iberis (Schleifenblume) saxatilis corifolia. Blendendweiß, 30 cm, April-Mai	0.50
" sempervirens Weißer Zwerg. Reinweiß, 25 cm, April-Mai	0.50
Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn unter Abt. B.	
Lavandula latifolia (vera). Der echte Lavendel. Belaubung graugrün, Blüten-	4 40
	0.50
" officinalis (spica). Höher wachsend als vorige, 40—50 cm .	0.50
Leontopodium (Edelweiß) alpinum. 15 cm, Juni-August	0.50
" sibiricum. Sehr großblumig, 20 cm	0.50
Linaria alpina (Frauenflachs). Reizende kleine Alpine mit blaugrüner Belaubung	
und zarten violetten Blüten, 10 cm, Juni-September	0.50
Linaria cymbalaria (Leinkraut). Rankend, lila, 10 cm, Juni-September	0.40
	0.30
Megasia siehe Bergenia vorn unter Abt. B.	
Myosotis palustris (Sumpfvergißmeinnicht) Perle von Ronnenberg. Groß-	
	0.40
Nepeta Mussini (Katzenminze). Niedrig, Belaubung silbergrau, Blütenrispen	
blau, 20 cm, Juni-Oktober	0.40
Omphalodes verna (Männertreu). Hellblau, 30 cm, April-Juni	0.40
Papaver nudicaule (Sibirischer Mohn). Weiß, gelb, orange, 25 cm, Mai-Juli	0.40
Patrinia palmata. Valerianacee für halbschattige Stellen. Die gelben Blüten	
blühen in lockeren Sträußen, 25 cm, Juli	0.80
	0.50
" divaricata (canadensis). Hellblau, 30 cm, April-Mai	0.50
	0.50
,, ,, Elfe siehe unter Neuheiten Abt. A.	
	0.50
" nivalis. Schneeweiß, 10 cm, April-Mai	0.50
	0.50
Plumbago Larpentae siehe Ceratostigma.	0.40
	0.60
Primula acaulis. Hybriden in schönstem Farbenspiel, 10 cm, April-Mai	0.40
" coerulea. Leuchtend blau	0.60
" auricula (Aurikel) syn. Auricula lutea. Echt, hellgelb, duftend,	0.10
20 cm, Mai	0.60
" elatior carpathica. Gelb, 20 cm	0.50
" elatior gigantea, Hamelner Hybriden. Riesenblumige, teils sehr	0.40
langstielige Varietäten im prächtigsten Farbenspiel	0.60
" elatior grdfi. Schöne Gartenprimel in prächtigen Farben, groß-	0.40
blumig, auch zum Schnitt wertvoll, 20 cm	0.40
" elatior grdfi. coerulea. Großblumige, blaue Gartenprimel .	0.50
francisco Decello 15 cm Mai Dillitar harticht	
" frondosa. Rosalila, 15 cm, Mai, Blätter bestäubt	0.60
" hybrida Lothringen. 20 cm, karminrosa, Mai-Juni	0.50
" Juliae. Violettrot, 5 cm, Mai . " pubescens (Pr. auricula × Pr. viscosa). Englische Aurikeln in	0.00
allen Farben, prachtvoll, 20 cm	0.50
races and Poveret 15 cm Mai Schönste Frühigherneimel für	0.00
feuchte Stellen	0.60
allelelements Cobservateles III - Differents Legisland Delde 10 and Local	0.00
Liebt feuchten Boden	0.70
Pyrethrum roseum hybr. nanum. 25 cm sattrosa, Mai-Juni	0.80
Ramondia myconi (pyrenaica). Gesneriacee. Rosettige Felsenpflanze für	0.00
schattige Plätze, mit tiefblau-violetten Blüten, 5—10 cm, Juni	1 -
Ranunculus gramineus (Hahnenfuß). Mit lanzettlichen Blättern und zitronen-	
gelben Blüten. Hübsche Pflanze für feuchte Stellen im Garten	
und Park, 25 cm hoch, Juni	0.60
Sagina subulata (Spergula pilifera). Niedrig, rasenbildend, Juni-August	0.30
" aurea. Goldgelbe Abart der vorigen	0.40
Santolina pinnata. Heiligenpflanze. Halbstrauch mit feingefiederter Belau-	20.72
bung und schwefelgelben Blütenköpfchen. 30 cm. Juli-August	0.50
	0.50
Satureia (syn. Calamintha) alpina. Bergminze. Polsterbildende Alpine mit	
	0.50
Saxifraga (Steinbrech) moosartige:	0.00
	0.40
II III in the second of the second se	
	0.50

Saxifra	aga hybrida magnifica. Großblütig, hellrosa, 20 cm, Mai	O.50
	" Purpurmantel. Karminrosa, 15 cm, April-Mai	0.50
"	" Schöne von Ronsdorf. Dunkelkarmin, 15 cm, April-Juni	-
"	,, rosea superba. Frisch karminrosa, 15 cm, April-Mai	
"	" splendens. Leuchtend dunkelkarmin, 15 cm, Mai	0.50
"	moosartige Hybriden, alle Farben gemischt	0.40
	rosettenartige:	2000
"	aizoides crocea. Lockere Polster, orangegelbe Blüten. Für feuchte	
"	Stellen, Juni-Juli, 10 cm	0.60
**	aizoon. Weiß, 25 cm, Juni-Juli	0.60
11	apiculata. Blaugrüne Blattrosetten in dichten Polstern. Hellgelbe	
	Blüten. 10 cm	0.6
"	cotyledon pyramidalis. Weiß, 50 cm, Juni-Juli	0.6
"	Elisabethae. Hybride mit hellschwefelgelben Blütenpolstern.	-
	April, 10 cm	0.6
"	Gaudinii. Silbergraue Rosetten mit weißen Blüten	0.5
"	oppositifolia latina. Niedriger, kriechender Wuchs. Blüten	
	purpurn. 3-5 cm	0.7
	umbrosa. Jehovablümchen. Fleischfarbig-rosa, 30 cm, April-Mai	0.3
Sedum	(Fetthenne) acre. Niedrig, gelblich, Juni-Juli	0.3
"	anacampseros. Blaugrün, Blüten purpurn. Kriechend, 15 cm, Juli-Aug.	0.5
**	Ewersii turkestanicum. Kräftig wachsend. Blüten dunkelrosa. 10 cm	0.5
11	lydium glaucum. Weißlich, bluagrüne Belaubung, Juni	0.3
.11	" aureum. Belaubung goldgelb	0.4
"	kamtschaticum fol. var. Gelbbunt, 20 cm, Juni-Juli	0.5
**	laconicum. Fleischige, runde Blätter, Blüten weiß. 10 cm. Juli	0.3
**	Middendorffianum. Kriechend, Knospen orange, Blüten goldgelb.	0.5
		0.5
11	obtusifolium. Gelb, 10 cm, Juni, Blätter bräunlich	0.5
"	reflexum. Leuchtend gelb, 15 cm, Juni, Blätter graugrün	0.4
"	spurium. Matt rosa, 20 cm, Juli-August	0.5
	" splendens. 20 cm, dunkelrot, Juli-August	
W	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae	0.5
W	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste	0.5
Sempe Silene	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm	
Sempe Silene	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm	
Sempe Silene A	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust	
Sempe Silene A Spergu Stachy	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern.	0.5
Silene Spergu Stachy	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust sla pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30-40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli	0.5
Silene Spergu Stachy Thymu	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30-40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli	0.5 0.3 0.5 0.5
Silene Spergu Stachy Thymu	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust sla pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30–40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli	0.5 0.5 0.5 0.5
Silene Spergu Stachy Thymu	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste	0.5 0.5 0.5 0.5
Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgel paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30–40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli , splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarelle Tunica	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgel paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayerl triste	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarelle Tunica	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. läten purpurn, 30–40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30–40 cm, Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm ca (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgel paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata. s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30–40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli acordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm ca (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli Immergrün major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig , fol. arg. var. Weißbunte Belaubung , fol. arg. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoldeum Moggridgel paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli seplendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig  " fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung " fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung ornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau. 20 cm, Mai-Oktober	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.8 0.4
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoldeum Moggridgel paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli seplendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig  " fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung " fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung ornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau. 20 cm, Mai-Oktober	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.8 0.4
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgel paniculatum glaucum Reginae Amaliae Thomayeri triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust ila pilifera siehe Sagina subulata.  si (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30–40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli szerpyllum (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig  fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung ornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober graft. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau  Newton Mauve. Malvenfarbia, sehr schön	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust sia pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli a cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig fol. arg. var. Weißbunte Belaubung roll aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung ornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober graft. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau, Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön, Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu "" Tiarelle Tunica Veroni Vinca "" Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste  ie Sorte 0.40 ie Sorte 0.50 ie Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust lia pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli cordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rosenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig fol. arg. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung ornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober graft. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte "White Perfection. Reinweiß	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rosenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung ornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober graft. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte "White Perfection. Reinweiß studienden!	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgel paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli acordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung ornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober grafi. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte "White Perfection. Reinweiß gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpur-	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5
Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca "" Viola	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgel paniculatum glaucum Reginae Amaliae rupicolum tomentosum Thomayeri triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust la pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli s (Thymian) serpyllum albus. Frischgrüne Polster, 5 cm, weiß, Juni-Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli acordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung ornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober grafi. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte "White Perfection. Reinweiß gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca "" Viola	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß übersponnen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei glaucum Reginae Amaliae rupicolum triste  je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust ila pliifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli acordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teurium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli (Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung ornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober grafi. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte "White Perfection. Reinweiß gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend papilionacea grandiflora. Pfingstveilchen, tiefblau, Mai-Juni	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum rupicolum triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust ila pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli acordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm ca (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli Immergrün major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober grafi. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau "Newton Mauve. Malvenforbig, sehr schön "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte "White Perfection. Reinweiß cucullata grafi. siehe papilionacea! gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend oppilionacea grandiflora. Pfingstveilchen, tiefblau, Mai-Juni andorata (wohlriechendes Veilchen) alba. Weiß, großblumig, März-	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6
Sempe Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum rupicolum triste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60 Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust ila pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli splendens. Leuchtend rot, polsterbildend, Juni-Juli acordifolia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm ca (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli Immergrün major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober grafi. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau "Newton Mauve. Malvenforbig, sehr schön "Royal Scott. Violettblau mit hellerer Mitte "White Perfection. Reinweiß cucullata grafi. siehe papilionacea! gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend oppilionacea grandiflora. Pfingstveilchen, tiefblau, Mai-Juni andorata (wohlriechendes Veilchen) alba. Weiß, großblumig, März-	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6
Silene Spergu Stachy Thymu Tiarella Tunica Veroni Vinca "" Viola	rvivum (Hauslauch). Rosetten hellgrün, dunkelgrün, blaugrün, purpurn, eiß überspannen. Alpha u. Beta siehe Neuheiten, Abt. A II. rvivum: globiferum arachnoideum Moggridgei paniculatum rupicolum friste je Sorte 0.40 je Sorte 0.50 je Sorte 0.60  Schafta (Alpenleimkraut). Rasenbildend, Blumen leuchtend rosa. 10 cm ugust ila pilifera siehe Sagina subulata.  s (Ziest) lanata. Einfassungspflanze mit weißwolligen Blättern. üten purpurn, 30 – 40 cm, Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, osa Blüten, Juli serpyllum lanuginosus. Graue Polster, rosa Blüten, Juli soldia (Schaumpflanze). Zierl. weiße Blüten, 20 cm, Mai, Halbschatt. saxifraga alba (Steinnelke). Aus zierlicher Belaubung erscheinen den anzen Sommer zierliche weiße Blüten, 15 cm ca (Ehrenpreis) repens. Weißlich, rasenbildend, Mai-Juni teucrium rupestris. Amethystblau, kriechend, 10 cm, Juni-Juli Immergrün) major. Großblättrig, blaublütig, Mai-Juni minor. Kleinblättrig "fol. aur. var. Kleinblättriges Immergrün, gelbbunte Belaubung cornuta (Hornveilchen) G. Wermig. Veilchenblau, 20 cm, Mai-Oktober graft. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau "Newton Mauve. Malvenfarbig, sehr schön "graft. Alpha. Großblumig, dunkel veilchenblau, white Perfection. Reinweiß ucullata graft. siehe papilionacea! gracilis Lord Nelson. Neue Varietät mit sehr schönen, tief purpurvioletten Blumen, März bis August blühend papilionacea grandiflora. Pfingstveilchen, tiefblau, Mai-Juni papilionacea grandiflora.	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5

									1	1 St. M.
Viola	odorata	Deutsche Kaiserin.	Blow	gefüllt				-	2	0.60
"	"	Königin Charlotte	3	. 2						0.40
	. "	Riese von Botnang.	Seh	r großb	lumig,	dunk	elblau			0.50
Wulfe	nia cari ährigen Tr	nthiaca. Prächtige :	en, lie	hulariace bt lehm	ige Er	de.	uen t	Juli	in .	0.60



Blühende Opuntia polyacantha (syn. missouriensis), winterharter Feigenkaktus, Sedum, Saxifraga und Sempervivum am Kakteenhügel meines Schaugartens.

#### D. Winterharte Kakteen.

Zur Bepflanzung warm und sonnig gelegener Felsenanlagen, Trockenmauern, Böschungen und Abhänge bilden die aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammenden winterharten Kakteen mit ihren eigenartig geformten, fleischigen Gliedern und ihrem prächtigen Blütenflor in gelben, orangefarbigen, in rosa und roten Tönungen ein schätzbares Material von eigenartig fremdländischem Charakter.

Zum Versuch empfehle ich nachfolgend angeführte Sorten:

	Zoni versoci empreme ici nacirolgena angeronire sorien.	
Opuntia	arborescens. Baumartig wachsender Feigenkaktus mit rundlichen, weißbestachelten Gliedern und scharlachroten Blüten. Selten. Je nach Größe	
"	brachyarthra. Kurze, plattwalzenförmige Glieder, Blüten gelb .	1.50
"	camanchica. Kreisrunde, flache Glieder, stark bewehrt, Blüten gelb	2
"	" major. Stark wachsend, mit besonders schöner Bestachelung	2.—
		2
"	humifusa (syn. Rafinesquii) var. arkansana. Länglich-eiförmige	
"	große Glieder, stark bewehrt, Blüten hellgelb, mitten gemsfarbig	2.—
"	"var. oplocarpa. Platt-eirundliche Glieder, am oberen Teil stark mit mittellangen Stacheln bewehrt, unten schwach besetzt. Blüten groß, grünlichweiß	2.50
"	humilis. Mit verkehrt eirunden und höckerigen Stachelpolstern, Blüten	1.50
"		2.—
"	pachyclada rosea. Höckerige, langgestreckte walzenförmige Glieder mit teils sehr langen, teils kürzeren sehr scharfspitzigen Stacheln.	2.—
"	polyacantha (syn. missouriensis). Platte, kreisförmige, stark be-	2.—
"	rhodantha. Mit länglich graugrünen, walzenförmigen Gliedern und	3.—

		1 St. M.
Opuntia	rutila. Eine der schönsten winterharten Opuntien, Glieder dick, läng- lich-walzenförmig, mit langen weißen Stacheln stark bewehrt	3.—
"	sphaeacantha. Große platte, wenig bestachelte Glieder. Selten	2.50
"	spirocentra. Aehnlich camanchica, aber längere weiße Stacheln	
"	xanthostemma. Kurze, rundlich platte Glieder, Blüten rötlich-gelb	
"	species 3. Plattrundliche, langgestreckte Glieder mit sehr langen bräunlichen, weiß gescheckten Stacheln. Blüten zartrosa	3.—
"	species G. 23. Platte, langgestreckte Glieder mit langen, in der Jugend bräunlichen, später weißlichen Stacheln, stark bewehrt	3
"	species 52. Lange, ovale, große Glieder, rosenrote Blüten	2



Opuntia humifusa var. oplocarpa. Einzelblüte. Am Kakteenhügel meines Schaugartens.

### E. Winterharte Freiland-Farne.

Farne lieben lockeren (laubhaltigen), oder durch Lauberde oder Torfmull verbesserten Boden. Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, auf Felsenanlagen und dergleichen, bieten sie eine Fülle des prächtigsten Materials.

a.i.a. a.a. 3.a.			are and the same are bracking				
			um (Krullfarn oder Venushaar). Zierliche winterhaarn) siehe unter Dryopteris und Polystichum!	irte .	Art		2.—
Asplenium	. (	Streife	enfarn) trichomanes. Haarfarnähnlich				0.50
Athyrium	(F	arnwe	ibchen) filix femina				0.40
"	f.		Fritzelliae. Mit gekrausten, schmalen Wedeln .				0.80
"	11		curtum multifidum. Petersilienbüschen ähnlich .		*		0.80
"	**		laciniatum. Mit gefranzten Wedelchen				0.80
"	**		ramo-cristatum. Kammartig verzweigt			4	0.80
"	**		cruciato-grandiceps. Kreuzweise gekraust			+	1
"	**	**	Vernoniae		4	+	3

			1 St. M.
Blechnum spicant (Rippenfarn). Wintergrün, Feuchtigkeit liebend			0.50
Cystopteris asplenioides. Streifenfarn ähnlich			0.50
" fragilis. Zierlicher als voriger			0.50
Dryopteris filix-mas. (syn. Aspidium filix-mas.). Farnmännchen.	Heim	. Farn	0.40
" Barnesii. Kräfrig wachsend, schön .			0.80
" decorum. Zierliches Fornmännchen .			0.80
" grandiceps. Großköpfig			0.80
" lineare. Feinlaubig, linear	4		1
" monstrosum. Kammartig gekraust .			0.80
Linnaeana (syn. Polypodium dryopteris). Mit zierlich	ien W	edeln	0.60
,, phegopteris (syn. Polypodium phegopteris). Buch	enforn		0.60
,, spinulosa (syn. Aspidium spinulosum). Kleindornart	ig bet	ärtet	0.40
Matteucia struthiopteris (syn. Struthiopteris germanica).	Strauf	Sfarn,	
heimische Art	4		0.70
" pennsylvanica. Pennsylvanische Art	4		1.50
Onoclea sensibilis. Amerikan. Sumpffarn, prächtig			0.80
Osmunda cinnamomea. Königsfarn mit zimtbraunen Fruchtwede			2
,, Claytoniana. Mit samtartig erscheinender Belaubung	4.		2.
gracilis. Zierlicher Königsfarn			1.50
regalis. Heimischer Königsfarn	4		1.20
Phyllitis scolopendrium (syn. Scolopendrium vulgare). Hirschi	tunge		0.50
" digitato-cristatum. Fingerförmig gete	eilte V	/edel	1.50
,, marginatum. Mit zierlich gekraustem !	Rand		2
" undulatum. Mit am Rande gewellten \	Vedel	n .	2
Polypodium (Tüpfelfarn). Siehe Dryopteris Linnaeana.			
" phegopteris. Buchenfarn. Siehe Dryopteris.			
" vulgare. Heimischer Tüpfelfarn			0.40
,, grande. Große Form			0.60



Seltenere Freilandfarne:

Polystichum aculeatum, Polystichum rotundatum, Adiantum pedatum,
Athyrium laciniatum und Felsensträucher:
Evonymus radicans, Cotoneaster horizontalis in meinem Felsengarten.

Polystichum		.80
**		.80
"		.80
11	,, proliferum. Zierlich zerteilte Wedel, brutbildend . 0	.80
"	그녀는 그녀는 그는	
**		.80
"	lobatum (Aspidium). Wintergrün. Gelappte Fiederchen, ähn- lich aculeatum	.80
"		.80

								St. M.
		Aspidium). Nordam		W	inter	grün		1
,, F	aleaceum	(Aspidium). Spreu		4	7	+		0.80
"	11	polydactylum. Vie	Ifingerig .			4		0.80
"	"	Stableri				4	4	1
Pteridium aq	uilinum (s)	n. Pteris aquilina).	Adlerforn .				4	0.40
Pteris aquilin		dium. , siehe Phyllitis.						
	ouglasii.	Moosfarn, selten. Kr	iechend .		*			0.80



Winterharte Freilandfarne: Blechnum, Matteucia, Athyrium und Polystichum in verschiedenen Sorten im halbschattigen Felsengarten meiner Görtnerei.

### F. Feuchtigkeit liebende Stauden.

(Beschreibung und Preise siehe unter Stauden B. und C.)

Ajuga — Aralia — Astilbe in Sorten — Bergenia (Megasia) — Caltha — Epilobium — Eupatorium — Filipendula — Hemerocallis — Heracleum — Hosta (Funkia) — Iris pseudacorus — Iris Gueldenstaedtiana — Iris Monnieri — Iris ochroleuca — Iris Kaempferi — Iris sibirica — Lysimachia — Myosotis palustris — Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum — Polemonium — Physostegia — Primula frondosa — Primula japonica — Primula pulverulenta — Primula rosea — Ranunculus gramineus — Rheum — Rodgersia — Saxifraga umbrosa — Senecio clivorum — Spiraea — Thalictrum — Tiarella — Trollius.

### G. Felsensträucher und Schlinger.

	us (syn. Ampelopsis) Veitchii. Prächtiger, selbstklimmender Efeu- ätter im Herbst blutrot gefärbt
	cifolia dulcis nana. Reizende, niedrige Berberitze, immergrün.
	partien. 30-40 cm
Cotoneaster	Dammeri (syn. humifusa). Kriechende Zwergmispel mit nieder-
- Andrews - Marian	liegenden Zweigen. Scharlachrote Früchte im Herbst 1.50 bis 2.50
"	Dielsiana (syn. applanata). Starkwachsende Art mit ovalen
	dunkelgrünen Blättern und glänzend roten Beeren 1
"	Franchetii. Höherer Strauch mit unterseits weißgelbfilziger Be-
	laubung. Früchte orangerot, 150 cm hoch 1.50
"	horizontalis. Fächerartig wachsend, rote Früchte . 1.— bis 2.—
"	pyrenaica (syn. microphylla glacialis). Reizender Felsen-
	strauch mit kleinen dunkelgrünen Blättern u. roten Früchten 1.50 bis 2.50
"	Simonsii. Blüten rötlichweiß. Beeren korallrot. 150 cm 1.50



Cotoneaster horizontalis, reich mit Beeren besetzt im Felsengarten meiner Gärtnerei.

Cytisus scoparius (Spartium scoparium). Einheimischer Ginster mit goldgelben	
Blûten	
Daphne mezereum. Seidelbast. Blüten purpurrot, Beeren korallrot 3.— Evonymus nanus (rosmarinifolius). Reizender Zwergstrauch, 50—60 cm	
hoch, mit dunkelgrünen, lanzettförmigen Blättchen, der im Herbst eine Fülle rosafarbiger Samenkapseln trägt	)
Evonymus radicans var. Arnold Arboretum. Völlig hart, kriech. u. schling. 0.50	
", reticulata (syn. argenteo-variegata). Weißbuntblättrig 1.— Forsythia suspensa. Stark wachsend, rankend und schlingend, goldgelb, April 0.50 Fuchsia Riccartoniana. Winterharte Fuchsie für geschützte Stellen; im Winter zurückzuschneiden und mit Laub zuzudecken. Reichblühende Sorte	
mit scharlachroten Blüten. Pflanzen mit Ballen 1.— bis 1.50 Genista dalmatica. Stacheliger, niedriger Ginster mit einer Fülle gelber, im	)
Juni-Juli erscheinender Schmetterlingsblüten	)
Lonicera nitida. Immergrün, der echt. Brautmyrte ähneInd, reizend 0.50—1.— " pileata. Immergrün, buxusähnliche Belaubung, Früchte violett 0.50—1.— Potentilla Farreri. Zierlich, gelbe Erdbeerblüten, langandauernder Blüher 0.50—0.75 Ribes alpinum. Gedeiht noch im tiefsten Schatten. Bleibt lange belaubt . 0.50 Salix retusa. Niedrige, kriechende Weide für Felspartien	,
Zwerg-Koniferen:	
Picea excelsa var. nana. Dichtzweigige, niedrige Fichte für Felsen- anlagen. Junge Pflanzen mit Topfballen . 1.— Pinus montana. Berg- oder Krummholzkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen 2. – bis 3.—	
Marie Pavie. Herrliche Polyantha-Rose mit zart fleischfarbig-weißen Blüten, bis zum Frost anhaltender Blüher, stark duftend	1
riesige Dolden, Blumen stark duftend, haltbar. Pflanze stark wachsend	
Frl. Octavia Hesse. Köstlich duftende, Edelrosen ähnlich blühende Schling- rose, Knospen der bekannten "Kaiserin AugVictoria" ähnlich, Pflanze stark rankend, mit prächtig glänzendem Laub. Blüten sehr lange haltbar! 1.—	
and a function fill produing glutterident coop. Didien sell folige honour fr	

# H.Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendrum und Heidekräuter.

In schneelosen Wintern ist eine leichte Bedeckung mit Tannenreisig anzuraten. Die Azaleen und Rhododendrum gehören zu unseren schönsten Blütensträuchern. Sie lieben lockere Heide-, Laub- oder Moorerde. Sie nehmen auch mit jedem, durch Torfmull verbesserten Gortenboden fürlieb.

Torfm	ull verbe	sserten Gartenboden fürlieb.		SLA
Andr	omeda	japonica. Lavendelheide. Japanische Ericacee. Imr	nergrüner	St. M.
Azale	grüne grüne orden Blüten	dsii. Winterharte, neue Azoleenkreuzungen, die mit ihr n Belaubung an Azalea indica erinnern. Die Pflanzen sin tlich reichblühend. Blumen wohlgeformt, 5—8 cm Dm variierend von zart lila, zart rosa, bis leuchtend karmi	er winter- nd außer- . haltend. nrosa. Im	6
"	ein Si ledifi molli	olia siehe Rhododendrum ledifolium. s hybrida siehe Rhododendrum japonicum.	4.— bis	5.—
**		gawa. Herrliche cattleyenfarbige Azalee	6 bis	12 -
Gault		rocumbens. Kriechende, 20 cm hohe Ericacee mit	0. 513	1 400
		mentlederartigen Blättern, weißen Blütchen u. leuchtend-		
		Beeren. Wintergrün		2.50
Gault		hallon. In allen Teilen größer werdend als vorige		
		n dunkelpurpurfarben, später blau-schwarz. Halb- en liebende, badenbedeckende Moorbeetpflanze		3.50
Kalm		olia. Lorbeerrose. Immergrüne Moorbeetpflanze mit		
		end dunkelgrüner Belaubung und becherformigen, in		7.
		n stehenden hellrosa Blüten	3 bis	6
Knod	odendr	um catawbiense grdfl. Prochtvolle, große lila Blüten. Wintergrün	4 bis	6-
	n	Cunninghamii. Sehr schöne, immergrüne Art mit	4. 513	0.
	**	weißen Blütendolden	4 bis	6
	"	flavum (syn. Azalea pontica) hybridum. Ein-		
		fach und gefüllt blühende Hybriden in verschiedenen	5 bis	4
	Sia.	flavum var. Daviesii. Außerordentlich reich	J. Dis	0.
	"	blühende Azalee, gesund wachsend und völlig		
		winterhart. Blüten rahmweiß mit gelb schattiert.	2	
		Prachtvoll	5 bis	6
	"	imbricatum. Niedrige Art mit glänzendgrünen Blättern und dunkelvioletten Blüten	4 bis	5-
	"	japonicum (syn. Azalea mollis) hybridum. Prächtige Hybriden in gelben, orange bis roten	4. 515	
		Schattierungen kamtschaticum. Laubabwerfende, zwergige Art	5 bis	6.—
	10	kamtschaticum. Laubabwerfende, zwergige Art	3 bis	
		mit großen rosa Einzelblüten im Mai. 10—15 cm hoch ledifolium album (syn. Azalea ledifolia alba).	3 bis	4.
	11	Reichblühende, reinweiße, wintergrüne Azalee	4 bis	8
	**	maximum roseum. Rosablühende, starkwüchsige		
		Alpenrose, Wintergrün	3.50 bis	
	"	roseum elegans. Prächtig rosa. Wintergrün	3.50 bis 4.— bis	
	"		4. 513	0.
Heide	ekräute	r:		
Callu	na vula	aris Alportii. Graugrüne Triebe, mit dunkelroten Blüten	0.80 bis	1
"		cuprea. Belaubung rötlich-gelb, Blüten lila .	0.80 bis	
11		fl. pl. Mit dichtgefüllten lila Blüten, schönstes	0.00.	
		aller Heidekräuter	0.80 bis	
Erica	carnea	(syn. herbacea). Winterhartes Heidekraut, das schon oft von Februar ab mit leuchtend rosenroten Blüten	0.80 bis	1
		überdeckt ist	0.70 bis	1
"	11	Vivellii. Schönste aller Erica carnea - Varietäten.		
	-19	Blüten leuchtend karmin, hervorragende Neuein-		
		führung. 15 cm. März-April	1 bis	1.50



Blühende Erica mediterranea hybrida in meinem Schaugarten.

Enter maditaneous behalds. Et as a Star billhand als services	1	St. M.
Erica mediterranea hybrida. Etwas später blühend als »carnea«. Blüten leuchtend dunkelrosa; außerordentlich lange andauernd "tetralix. Heimische Glockenheide mit rosa Blütenglöckchen "tetralix alba. Graufilzige Glockenheide mit weißen Blüten	0.70 bis 0.80 bis 0.80 bis	1
Menziesia empetrifolia. Kriechendes Heidekraut mit breit- nadeliger Belaubung und leuchtend rosenroten Blütenglöckchen im Mai	0.80 bis	1

## J. Winterharte Seerosen — Nymphaeen.

Die Kultur der Wasserpflanzen und besonders die der winterharten tropischen Nymphaeen habe ich von Jahr zu Jahr mehr gepflegt. Es gibt kaum dankbarere Pfleglinge unter den Kindern Floras, als die tropischen Schwestern unserer heimischen, weißen Seerose, der Nymphaea alba, die fast alle von Ende Mai bis Oktober ununterbrochen ihre lieblichen Blumen in den prächtigsten Farbenschattierungen entfalten und das Auge des Beschauers entzücken.

Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, hölzerne, gereinigte Wassergefäße (durchsägte Fässer u. dergl.) je nach Art der betreffenden Pflanzen, also
größer oder kleiner, die an einem möglichst vor rauhen Winden geschützten und recht
sonnigen Platze im Garten eingegraben und etwa ½ Fuß hoch mit reiner, lehmiger
Gartenerde und dann mit Wasser gefüllt werden, genügen zur Kultur der verschiedensten Wasserpflanzen.

Es ist bei Bestellungen von Laien geraten, mir gütigst anzugeben, wohin die Seerosen u. a. gepflanzt werden sollen, damit ich Vorschläge machen, resp. die geeignete Auswahl von Sorten treffen kann. Nur auf diese Weise bleiben Nicht-

Kenner vor Mißerfolgen geschützt.

Alle hier angeführten Wasserpflanzen, bei denen nichts näheres angegeben ist, sind auch in unserem norddeutschen Klima (bei minus 20 Grad Celsius) winterhart und bedürfen in Teichen und Seen keines Schutzes im Winter; in kleinen Bassins oder eingegrabenen durchsägten Fässern kultivierte Pflanzen schützt man durch eine auf übergelegte Stangen ausgebreitete und die Behälter überragende Tannenreisig-Deckung oder sonstwie.

NB. Dm. bedeutet Durchmesser der Blumen, Wstd. bedeutet den für die

Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand.

Versand ab Mitte April bis Anfang August.

#### Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 12 Abbildungen Mk. 0.40; postfrei Mk. 0.45. 1 St. M. Nymphaea alba. Heimische weiße Seerose, 30-100 cm Wstd. je nach Stärke 1.50 bis 3.hybrida atropurpurea. Tief karmesin, 18 cm Dm., 40-80 cm Wstd. 8. - bis 12. colossea. Fleischfarbig, 15-20 cm Dm., 40-100 cm Wstd. . 6.- bis 10.-Escarboucle. Zinnoberrot, 15-20 cm Dm., 40-100 cm Wstd. . 10 .- bis 12. -Froebelli. Feurig dunkelrot, 10-15 cm Dm., 11 30-100 cm Wstd. . 6. bis 10 .-Graciella. Zierliche orangerötliche Varietät für kleine Behälter, 20-40 cm Wstd. 6.- bis 8.-Laydekeri rosea. Karmoisinrot, 10-15 cm Dm., 30-80 cm Wstd. . 8. bis 10.-Marliacea albida. Milchweiß, 10-18 cm Dm., 55 50 -100 cm Wstd. 5.- bis 8.carnea. Hellfleischfarbig, 10 – 18 cm Dm., 50-100 cm Wstd. . 4.- bis 6.chromatella. Nielgelb, 10-18 cm Dm., 50-100 cm Wstd. . . . 5 .- bis 8 .rosea. Hellrosa, 10-18 cm Dm., 11 50-100 cm Wstd. 6.- bis 9.-Mr. James Brydon. Halbgefüllt, kugelförmig, violettrot, 12-15 cm Dm., 40-100 cm Wstd. . 10.- bis 12.-Sioux. Kupfriggelb mit rot verwaschen, 40-60 cm Wstd. . . 6.- bis 8.-Vesuv. Feurig amarant, 10-15 cm Dm., 40-80 cm Wstd. 10. - bis 15.-W.B. Shaw. Großblumig, zartrosa, wohlriechend 5.— bis 6.— Wm. Falconer. Dunkel granatrot, 10-15 cm 11 odorata pumila (minor). Zwergform von odorata rosea.



30-50 cm Wstd.

Nymphaea odorata Rosennymphe in meinem großen Seerosenbassin in Blüte.

	ea oaorata	Rosennymphe. Neuheit eigener Zucht. Herr- liche, duftende Blüte, leuchtend hellrosa, 12 – 18 cm		1 St. M.
11	"	Dm., 40-80 cm Wstd	8.— bis	
,,	tuberosa	100 cm Wstd	8.— bis	12
,,	"	20 cm Dm., 50-100 cm Wstd. Pöstlingberg. Riesenblüten,	4.— bis	5 7
		schneeweiß, größte aller winterharten Seerosen (eig. Einführ.) 15—22 cm Dm., 50—100 cm Wstd.	6.— bis	8
"	"	Helen Fowler. Reinrosa, 10—20 cm Dm., 40—80 cm Wstd	6 bis	8
**	"	Wstd	4.— bis	6
**	"	Richardsonii. Ballförmig gefüllt, schnee- weiß, 12-18 cm Dm., 40-80 cm Wstd	5.— bis	8.—
	"	rosea. Zartrosa, 10—15 cm Dm., 50—80 cm Wstd.	5.— bis	8.—
K. St	mpf-	und Wasserpflanzen fürs	s Fre	eie.
Acorus c	alamus (Kali	mus). Für Sumpf und flachen Wasserstand		0.60
"	" var	legatus. Buntblättrig		0.90
	lantago (Fr	oschlöffel). Sumpf und flaches Wasser		0.50
Aponoge	ton distach	yus (Wasserähre) mit gabelförmig ausgebreitete	n, sehr	
		weißen Blumen, liebt 30—100 cm tiefen Wasse lätter und knolliger Wurzelstock	erstana.	2
		(Wasserviole). Sumpf und flaches Wasser .		0.50
Calla ae	thiopica sie	he Zantedeschia.		0,00
Calla pa	lustris. Sum	pfkalla für flachen Wasserstand, Juni-Juli		0.70
Caltha p	alustris fl.	ol. Gefüllte Sumpfdotterblume, Mai	4 6	0.70
Ceratopi	nyllum dem	ersum (Hornkraut). Unterwasserpflanze		0.50
Cyperus	asper. Win	terhartes Cypergras, Sumpf und Wasser	0.50 bis	s 1.50
"	pungens Ste	echendes Cypergras), wird bei guter Kultur im Freien	ebenso	1 50
		asper. Kronenblätter scharfspitzig. Frostfrei zu über		
		mmblätter oval, Blüten weiß, auf dem Wasser schwir	mmend,	
-31/-	-40 cm Wass			
	marrantian w	meiography (con El enochabille fol com) C.	Seemen	0.50
Glyceria	aquatica v	ariegata (syn. Gl. spectabilis fol. var.). Si	üssgras.	
Glyceria We	iss und grün	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches	Wasser	0.70
Glyceria We Hippuris	iss und grün vulgaris (To	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser	Wasser	0.70
Glyceria We Hippuris Juncus g	iss und grün vulgaris (To laucus. Schö	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse	Wasser	0.70
Glyceria We Hippuris Juncus g	iss und grün vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser	Wasser	0.70 0.30
Glyceria We Hippuris Juncus g ,, z Limnanti	iss und grün vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus. iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See	Wasser	0.70 0.30 0.40
Glyceria We Hippuris Juncus g ,, z Limnanti Brack	iss und grün vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte nia nummul	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e <b>Scirpus Tabernaemontanus.</b> iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See e Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wass aria (Pfennigkraut). Uferpflanze	Wasser kanne. erstand	0.70 0.30 0.40
Glyceria We Hippuris Juncus g " z Limnantl Brack Lysimack Menyant	iss und grün vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte nia nummule thes trifolia	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser	Wasser ekanne. erstand	0.70 0.30 0.40 0.50 0.30 0.50
Glyceria We Hippuris Juncus g ,, z Limnanti Brack Lysimack Menyant Mimulus	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte nia nummula thes trifolia cupreus. G	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser	Wasser ekanne. erstand	0.70 0.30 0.40 0.50 0.30 0.50
Glyceria We Hippuris Juncus g " z Limnantl Brack Lysimack Menyant Mimulus Stel	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte nia nummula thes trifolia cupreus. G len. Blüten g	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus. iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wasser (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht	wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.30 0.50
Glyceria We Hippuris Juncus g ,, z Limnantl Brack Lysimack Menyant Mimulus Stel Myosotis	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte nia nummul thes trifolia cupreus. G len. Blüten o palustris P	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht).	Wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40
Glyceria We Hippuris Juncus g ,, z Limnantl Brack Lysimack Menyant Mimulus Stel Myosotis	iss und grün vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte hia nummule thes trifolia cupreus. G len. Blüten g yllum vertic	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wasser (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt	Wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40
Glyceria We Hippuris Juncus g Limnantl Brack Menyant Mimulus Stel Myosotis Myrioph	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte nia nummula thes trifolia cupreus. G len. Blüten o palustris P yllum vertic	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wasser (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser auklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt	Wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40
Glyceria We Hippuris Juncus g Z Limnantl Brack Lysimack Menyant Mimulus Stel Myosotis Myriophy	iss und grün vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte hes trifolia cupreus. G len. Blüten g yllum vertic Nitsch	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt. Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand	Wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.4
Glyceria We Hippuris Juncus g Z Limnantl Brack Menyant Mimulus Stel Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte hes trifolia cupreus. G len. Blüten o palustris P yllum vertic Nitsch Kalmianum um bistorta	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser	Wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 3.— 0.50
Glyceria We Hippuris Juncus g Z Limnantl Brack Menyant Mimulus Stel Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontede	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte hes trifolia cupreus. G len. Blüten g yllum vertic Nitsch Kalmianum um bistorta ria cordata	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt ele. Geteilt wachsendes Tausendblatt Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand	wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 3
Glyceria We Hippuris Juncus g " z Limnantl Brack Lysimack Menyant Mimulus Stel Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontede Ronuncu Sagittari	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte hes trifolia cupreus. G len. Blüten o palustris P yllum vertic Nitsch Kalmianum um bistorta ria cordata lus lingua () a sagittifolia	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse ine Scirpus Tabernaemontanus.  Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser in Gelb, kupfrig getuscht in Gelberklee in Gestellt wachsendes Tausendblatt in Geteilt wachsendes Tausendblatt in Geteilt wachsendes Tausendblatt in Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand in (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser in (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser	Wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 3 0.50 0.50 0.30
Glyceria We Hippuris Juncus g " z Limnantl Brack Menyant Mimulus Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontedei Ronuncu Sagittari	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte hes trifolia cupreus. G len. Blüten o palustris P yllum vertic Nitsch Kalmianum um bistorta ria cordata lus lingua () a sagittifolia	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse ine Scirpus Tabernaemontanus.  Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser in Gelb, kupfrig getuscht in Gelberklee in Gestellt wachsendes Tausendblatt in Geteilt wachsendes Tausendblatt in Geteilt wachsendes Tausendblatt in Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand in (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser in (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser	Wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 3.— 0.50 0.50 0.30
Glyceria We Hippuris Juncus g " Limnantl Brack Menyant Mimulus Stel Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte hes trifolia cupreus. G len. Blüten g yllum vertic Nitsch Kalmianum um bistorta ia cordata lus lingua ( abernaemo flachen Was	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus.  Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iei. Geteilt wachsendes Tausendblatt iei. Geteilt wachsendes Tausendblatt iei. Geteilt wachsendes Tausendblatt (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand (Wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser ia (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser in (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser in (Pfeilkraut). Juncus zebrinus). Zebrabinse. Für serstand	wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 3 0.50 0.50 0.30
Glyceria We Hippuris Juncus g " z Limnantl Brad Lysimach Menyant Mimulus Stel Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T und Spargan	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte hes trifolia cupreus. G len. Blüten o len. Blüten o yllum vertic Nitsch Kalmianum um bistorta ria cordata lus lingua ( abernaemo flachen Was ium ramosu	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ne, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus.  Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See e Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wasser (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser eauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iei. Geteilt wachsendes Tausendblatt iei. Geteilt wachsendes Tausendblatt iei. Geteilt wachsendes Tausendblatt (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser in (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser in (Igelkolben). Sumpf oder Wasser	wasser ekanne. erstand schützte	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 3.— 0.50 0.50 0.30
Glyceria We Hippuris Juncus g Limnantl Brack Lysimach Menyant Mimulus Stel Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T und Spargan Stratiote	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte hes trifolia cupreus. G len. Blüten o palustris P yllum vertic Nitsch Kalmianum um bistorta ia cordata lus lingua (V abernaemo flachen Was ium ramosu is aloides (V	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse e Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser sauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand (Wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser (Igelkolben).	wasser ekanne erstand schützte Spitzen	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.5
Glyceria We Hippuris Juncus g  Limnantl Brack Menyant Mimulus Myosotis Myrioph Nuphar Polygone Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T  und Spargan Stratiote	vulgaris (Tollaucus, Schölebrinus sieh hemum nymunmarmorierte hemum nymunmarmorierte hes trifolia cupreus. Gen. Blüten of palustris Pyllum vertic Nitsch Kalmianum in bistorta ria cordata lus lingua (la sagittifoliabernaemo flachen Wasium ramosus aloides (dem Wasser)	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse ine Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser sauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand (Wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser intanus (syn. Juncus zebrinus). Zebrabinse. Für serstand (Igelkolben). Sumpf oder Wasser Wasseraloe). Untergetaucht wachsend, mit den hervorragend. Blüten weiß	wasser ekanne. erstand schützte Spitzen	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 3 0.50 0.50 0.30
Hippuris Juncus g Limnantl Brack Menyant Mimulus Myosotis Myrioph Nuphar Polygone Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T und Spargan Stratiote Ous Thalia d	vulgaris (To laucus. Schö ebrinus sieh hemum nym unmarmorierte hes trifolia cupreus. G len. Blüten o palustris P yllum vertic Nitsch Kalmianum um bistorta ia cordata lus lingua (V abernaemo flachen Was ium ramosu s aloides ( dem Wasser ealbata. O	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse ine Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand (Wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser intanus (syn. Juncus zebrinus). Zebrabinse. Für serstand (Igelkolben). Sumpf oder Wasser Wasseraloe). Untergetaucht wachsend, mit den hervorragend. Blüten weiß rnamentale Blattpflanze, 50—70 cm hoch. Blätte	wasser ekanne. erstand schützte Spitzen er herz-	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 3 0.50 0.50 0.30 0.40
Glyceria We Hippuris Juncus g Limnantl Brack Lysimack Menyant Mimulus Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T und Spargan Stratiote Thalia d förn	vulgaris (Tollaucus. Schölebrinus sieh hemum nymunmarmorierte hes trifolia cupreus. Gen. Blüten gen. Gen. Blüten g	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse ine Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser sauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt. Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser intanus (syn. Juncus zebrinus). Zebrabinse. Für serstand im (Igelkolben). Sumpf oder Wasser Wasseraloe). Untergetaucht wachsend, mit den hervorragend. Blüten weiß rnamentale Blattpflanze, 50—70 cm hoch. Blätte lütenähren violett. Frostfrei zu überwintern	kanne. erstand schützte Spitzen r herz- 1.50 bi	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.5
Glyceria We Hippuris Juncus g Limnantl Brack Menyant Mimulus Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T und Spargan Stratiote aus Thalia d förn	vulgaris (Tollaucus. Schölebrinus sieh hemum nymunmarmorierte hes trifolia cupreus. Gen. Blüten gen. Gen. Blüten g	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse ine Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser sauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt. Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser intanus (syn. Juncus zebrinus). Zebrabinse. Für serstand im (Igelkolben). Sumpf oder Wasser Wasseraloe). Untergetaucht wachsend, mit den hervorragend. Blüten weiß rnamentale Blattpflanze, 50—70 cm hoch. Blätte lütenähren violett. Frostfrei zu überwintern	kanne. erstand schützte Spitzen r herz- 1.50 bi	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.4
Glyceria We Hippuris Juncus g Limnantl Brack Menyant Mimulus Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T und Spargan Stratiote Typha m Typha m	vulgaris (Tollaucus. Schölebrinus sieh hemum nymunmarmorierte hes trifolia cupreus. Glen. Blüten of palustris Pyllum vertic Nitsch Kalmianum um bistorta ria cordata lus lingua (la sagittifolia abernaemo flachen Wassium ramosus dem Wasser ealbata. Onig-eirund. Butifolia (Rohrinima. Zier	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse ine Scirpus Tabernaemontanus.  Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze ta (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gesgelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iei. Geteilt wachsendes Tausendblatt iei. Geteilt wachsendes Tausendblatt. Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser in (Igelkolben). Sumpf oder Wasser wasseration (Igelkolben). Sumpf oder Wasser Wasseraloe). Untergetaucht wachsend, mit den hervorragend. Blüten weiß rnamentale Blattpflanze, 50—70 cm hoch. Blätte lütenähren violett. Frostfrei zu überwintern kolben). Breitblättrig licher Rohrkolben, 30—40 cm Wasserstand	kanne. erstand schützte Spitzen r herz- 1.50 bi	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 3 0.50 0.30 1 0.40 0.40
Glyceria We Hippuris Juncus g  Limnantl Brack Lysimach Menyant Mimulus Stel Myosotis Myrioph Nuphar Polygone Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T  und Spargan Stratiote Typha la Typha la Typha la Typha la Typha la Typha la	vulgaris (Tollaucus. Schölebrinus sieh hemum nymunmarmorierte hes trifolia cupreus. Gen. Blüten gen. B	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse ine Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze tra (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand (Wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Butten weiß (Igelkolben). Breitblättrig (Igelkolben).	kanne. erstand schützte Spitzen er herz- 1.50 bis	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.4
Glyceria We Hippuris Juncus g  Limnantl Brack Menyant Mimulus Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T  Spargan Stratiote Typha in	vulgaris (Tollaucus, Schölebrinus sieh hemum nymunmarmorierte hes trifolia cupreus, Glen, Blüten of palustris Pyllum vertic Nitsch Kalmianum um bistorta ria cordata lus lingua (Valum ramosus aloides (dem Wasser ealbata, Onig-eirund, Butifolia (Rohrinima, Zier nymphaeoischia (syn. Richard)	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse ine Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze tra (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt. Zierliche Teichrose, 30—50 cm Wasserstand (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser (Wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser (Igelkolben). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Butten weiß (Igelkolben). Breitblättrig (Igelkolben).	kanne. erstand schützte Spitzen er herz- 1.50 bis	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.5
Glyceria We Hippuris Juncus g  Limnanti Brack Menyant Mimulus Myosotis Myrioph Nuphar Polygoni Pontede Ronuncu Sagittari Scirpus T und Spargan Stratiote Typha la	vulgaris (Tollaucus. Schölebrinus sieh hemum nymunmarmorierte hes trifolia cupreus. Gen. Blüten e palustris Pyllum vertic Nitsch Kalmianum mistorta ria cordata lus lingua (la sagittifolia abernaemo flachen Wasium ramosus aloides (dem Wasser ealbata. Onig-eirund. Butifolia (Rohrinima. Zier nymphaeoischia (syn. Richia la la den	längs gestreiftes Gras für feuchte Stellen u. flaches innenwedel). Sumpf und Wasser ine, dichte Büsche bildende, blaugrüne Binse ine Scirpus Tabernaemontanus. Iphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). See Schwimmblätter u. gelbe Blüten. 30—50 cm Wassaria (Pfennigkraut). Uferpflanze tra (Fieberklee). Sumpf und flaches Wasser iauklerblume. Prächtige Sumpfpflanze für gestelb, kupfrig getuscht erle von Ronnenberg (Vergißmeinnicht) illatum. Quirlständiges Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt iel. Geteilt wachsendes Tausendblatt (Wasserknöterich). Flaches Wasser (Wasser-Hyacinthe). 20 cm Wasserstand (Wasser-Hahnenfuß). Meterhoch, flaches Wasser (Pfeilkraut). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Sumpf oder Wasser (Igelkolben). Butten weiß (Igelkolben). Breitblättrig (Igelkolben).	kanne. erstand schützte Spitzen er herz- 1.50 bis	0.70 0.30 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.5

# L. Winterharte Ziergräser.

			1 St. M.
rohr	. Altere Pflo	ca (syn. Bambusa Metake). Stark wachsendes Bambus- anzen ohne Schutz winterhart. 3 m hoch werdend. Je	
nach	Stärke .		is 8.—
Arundo d	donax. Kla	2.— b prinettenrohr. 2 m hoch wachsend, für feuchten Boden Winterschutz	1.50
		iehe Arundinaria japonica.	
		verg-Bambusrohr. 40—50 cm h., weite Ausläufer bildend	
"		L 1	1.50
	aber aid	chtbuschig	1,50
"	nigra sien	e Phyllostachys nigra.	
- "	Simonii.	Weite Ausläufer bildend, locker gebaut 3. – b	15 4
		tes Cypergras). 1 m hoch, für Sumpf und flachen	
Was	serstand	erhohes Gras mit breiten, schön blauweiß bereiften Blättern	15 1.50
Elymus gl	aucus. Met	erhohes Gras mit breiten, schön blauweiß bereitten Blätterr	0.60
Eulalia jo	ponica siel	he Miscanthus sinensis.	
Festuca c	glauca. Blo	augrüne Büsche bildend	. 0.30
Glyceria	aquatica f	fol. varieg. (syn. Gl. spectabilis fol. var.). Weiß und	
arün	längs gestr	reiftes Gras für feuchte Stellen	. 0.70
		lora siehe Miscanthus saccharifer.	
		ifer (syn. Imperata sacchariflora). Stielblütengras mit	
	federigen	Blütenständen	0.70
7.5	sinensis	gracillimus (syn. Eulalia japonica gracillima).	-11
""	3111011313	Ahnlich dem Pampasgras 1.— bi	2 -
		Alltings delli sampasgius	I de mar
**	**	variegatus (syn. Eulalia jap. fol. var.) Mit weißbunt	- 2
		gestreiften Blättern . 1.50 bi zebrinus (syn. Eulalia jap. zebrina). Blätter gelblich	5 3.
11	11	zebrinus (syn. Eulalia jap. zebrina). Blatter gelblich	
		quergestreift 1.50 bi	5 3.—
**	**	,, strictus. Straff aufrechte Belaubung, sonst	
		wie vorige 1.50 bi	5 3
Phalaris	arundinace	ea picta. Weißbuntes Bandgras	. 0.50
Phyllosta	chys nigra	(syn. Bambusa nigra). Schwarzstengeliges, prächtiges	
		erlangt unten etwas Winterschutz 4.— b	



Miscanthus sinensis variegatus (syn. Eulalia) am Ufer eines Seerosen-Bassins in meinem Schaugarten.

# M. Aquarienpflanzen.

	St. M.
Azolla caroliniana. Kleine, schuppenartig belaubte, sich rasch vermehrende	
Schwimmpflanze mit schönen hellgrün bis braunroten Blattschuppen 10 St.	0.60
Azolla filiculoides. Kleine Schwimmpflanze mit gelbgrün und braunroten	
Blattschuppen	0.60
Ceratophyllum demersum. Hornkraut. Untergetaucht wachsend Cyperus alternifolius. Wechselblättriges Cypergras 0.50 bis	0.30
Cyperus airernitolius. Wechselblaffriges Cypergras 0.30 bis	1.50
Cyperus pungens. Stechendes Cypergras. Kronenblätter scharfspitzig Eichhornia azurea. Hellblau blühende Wasserhyazinthe mit schmalen Unter-	1.50
1 law 1 laye 1ee 1 law 1 hit law	2.50
Eichhornia crassipes. Wasserhyazinthe mit blasig aufgetriebenen Blattstielen	2.00
	1.50
Helodea callitrichoides. Zierliche Wasserpest, reizend für Aquarien	0.30
Herpestis (syn. Bacopa) amplexicaulis. Allerliebste Ueber- und Unterwasser-	
pflanze mit dickem, fleischigem Stiel und gegenständigen, stengel-	
	1,-
" Monniera (syn. Bacopa). In allen Teilen zierlicher als vorige	1
Heteranthera dubia. Schmalblättriges Trugkölbchen. Zierliche Aquarien-	0.75
Heteranthera reniformis. Nierenblättriges Trugkölbchen. Reich verzweigt	0.73
wachsend. Blüten klein, hellblau	1
Heteranthera zosterifolia. Seegrasblättriges Trugkölbeken aus Brasilien,	
mit dunkelgrünen, linearisch-lanzettlichen, zugespitzten Blättern und kleinen	
unscheinbaren, hellblauen Blüten	0.75
Hippuris vulgaris. Tannenwedel	0.40
Hydrocleis nymphoides (syn. Limnocharis Humboldtii). Eine der aller-	
schönsten Aquarienpflanzen mit großen gelben dreiblättrigen Eintags- blüten und ovalen Schwimmblättern	1.25
Hydromystria stolonifera (syn. Trianaea bogotensis). Schwimmpflanze	1.23
mit rundlichen, blasig aufgetriebenen Blättern. Ausläufer treibend. Blüten	
grünlich	0.75
Jussieua angustifolia. Schmalblättrig	0.40
" grandiflora. Stengel kantig, fast aufrecht, dicht behaart, Blätter	
länglich-lanzettlich, weich behaart. Blüten gelb	1
Jussieua octonervia. Pyromidal wachsend, reichblühend Limnanthemum nymphaeoides (syn. Villarsia nymphaeoides). Seekanne	0.75
Schwimmblätter braun marmoriert, Blüten gelb	0.50
Limnobium Bosei. Froschbiß mit kleinen, rundlichen Blättern, reizende Schwimm-	
pflanze	1
Limnobium Spongia. Amerikanischer Froschbiß mit etwas größeren Blättern,	
Ausläufer treibend	1
Limnocharis flava (syn. L. emarginata). Schöne Aquarienpflanze für flachen	
Wasserstand mit großen, hellgrünen Blättern und großem Blütenstand, der mit hellgelben Blüten besetzt ist	1
Ludwigia Mulertii. Blätter eirundlich, smaragdgrün	0.50
Lysimachia nummularia. Pfennigkraut. Blüten goldgelb	0.20
Myriophyllum brasiliense (syn. M. proserpinacoides). Smaragdgrünes,	
moosartiges Tausendblatt	0.50
,, prismatum. Mit zartgefiederten Blättchen	0.50
verticillatum. Quirlständiges Tausendblatt	0.50
Nuphar Kalmianum. Zierliche Teichrose	2
Ranunculus lingua. Zungenblättriger Wasserhahnenfuß mit großen gold-	0.40
gelben Blüten	0.40
Blütchen, Knollentragend	1
Sagittaria latifolia. Sehr schöne Aquarienpflanze mit breiten Blättern und	
zierlichem Blütenstand	1
Sagittaria leucopetala (japonica). Pfeilkraut mit großen, einfachen Blüten	1
Saururus Loureiri. Blätter herzförmig, Blüten in endständiger Traube, Pflanze	
aus dem Wasser wachsend	0.75
Salvinia auriculata. Schwimmforn aus Südamerika, im Sommer auch im	2
Freien gedeihend	0.50
Telanthera philoxeroides. Leichtwachsende Aquarienpflanze	0.40
Vallisneria spiralis. Sumpfschraube. Geschätzte Aquarienpflanze	0.50
Villarsia nymphaeoides, siehe Limnanthemum.	



Meine Seerosen auf der Ausstellung in Liegnitz 1927.

#### N. Gladiolen.

(Beste Pflanzzeit: Ende März bis Anfang Mai. In leichtem Boden beträgt die Pflanztiefe für die Knollen 10 cm, in schwerem Boden etwa 8 cm. Lockerung des Bodens und reichliche Bewässerung bei Trockenheit anzuraten. Wenn im Herbst die Blumen abgefroren sind, werden die Stiele etwa 5 cm über dem Erdboden abgeschnitten, die Knollen vorsichtig ausgehoben und frostfrei und trocken überwintert.)

Deutsche	Riesen-Edelg	THE STATE OF THE S	bis 0.30
"	"	in feinster Mischung . 10 St. 1.60	1 St. 0.20
Gladiolus	gandavensis	in Mischung 100 St. 12, 10 St. 1.40	1 St. 0.15
"	primulinus.	in Mischung 100 St. 12.—, 10 St. 1.40, Reich- und frühblüh. prächtige Sorten, 10 St. 1.50,	1 St. 0.20
"	"	In bester Mischung 100 St. 9, 10 St. 1.20	. 1 St. 0.15

	" In bester misching 100 at.		U SIL	1.60,	31. 0.13
	O. Sortimente.				15.4
					1.5r. M.
25	Stauden in 10-20 guten Sorten meiner Wahl .	7	* +	¥.	. 12
100	Stauden in 15-20 guten Sorten meiner Wahl .				. 40.—
25	feinere Stauden in 10-20 Sorten meiner Wahl .				. 15
100	feinere Stauden in 15-20 Sorten meiner Wahl .				. 50.—
	Stauden in 10-20 der besten Sorten meiner Wahl, o				
	Stauden in 15-20 der besten Sorten meiner Wahl, a				
	Felsen- und Einfassungsstauden in guten älteren Sorte				25
	Felsenstauden in 20-30 feineren Sorten meiner Wah				. 35.—
	Felsenstauden in 20-30 feinen und seltenen Sorten		r Wal	1 .	. 50.—
	winterharte Freilandforne in guten Sorten meiner Wa				. 4.50
10	in hesseren Sorten meiner	Wahl			. 6.50
10	in feinen Sorten meiner Wo	hl			9.—
10	Kelsters (Operation) in Sector mainer Wel				. 15.—
	" Wasser- und Sumpfpflanzen in Sorten mei				4
10					bis 50
	" Seerosen in guten Sorten meiner Wahl			Car Same	
10	in feinen Sorten meiner Wahl		5 5	00	bis 80.—
10	Dahlienknollen in besten Sorten meiner Wahl	· W	* *	0.	5
10	" in besten neueren Sorten meiner Wah				bis 10.—
10	" in besten Neuheiten meiner Wahl.				bis 20.—
25		*			bis 20.—
100	" meiner Wahl aus allen Klassen .	*		40	bis 80.—

Beschreibende Dahlien-Liste auf gefl. Anfrage kostenlos!

Ueber meine Schaustellungen in Liegnitz 1927 schreibt »Der Blumenund Pflanzenbau«, Berlin, in Heft 26, Jahrgang 1927: Ein großer Teil der
Liegnitzer Wasserbecken war durch die Firma Heinrich Junge in Homeln mit einem
erlesenen Sortiment von etwa 70 Stück dieser Seerosen besetzt worden, unter denen
sich mehrere eigene Züchtungen von großer Schönheit befanden. Am meisten gefiel
davon die starkduftende, reinrosafarbene Rosennymphe, weiter die schon bekannten,
reinweißblühenden, großblumigen Sorten N. Gladstoniana und die noch riesigere,
schöne Abart N. Gladstoniana Pöstlingberg. Als die schönsten weinroten Sorten
traten dort N. Froebeli und Wm. Falconer in Erscheinung, zu welchen die gefülltblühende N. tuberosa Richardsoni ein prächtiges Gegenstück bildete. Aber auch
die bekonnteren schönen Sorten, wie Marliacea albida, Marl. carnea, Marl.
rosea, W. B. Shaw, superba . . . ebenso ein buntlaubiger, weißblühender Sämling
von N. Arethusa, erregten durch ihre Schönheit viel Bewunderung.

Uber meine Stauden-Schaustellung auf der Dresdener Sonderschau vom 3. bis 6. September 1926 schreibt der «Blumen- und Pflanzenbau«, Berlin, Seite 297, 1926:

Die beachtenswerteste Sammlung neuerer Stauden war die von Heinrich Junge, Hameln. Außer schon bekannteren Sachen, wie Rudbeckia purpurea, Artemisia loctiflora, Phlox decussata-Sarten und Delphinium-Hybriden, fielen dart neben älteren die prächtigen neuen Aster amellus-Sarten: Kobold, Silberblick, Perkea, Hunold, Weserperle, Lichtblick und deutscher Sieger besonders auf: weiter ein reingelbes, nur mittelhoch wachsendes und bis zum Frost remantierendes Helenium Goldene Jugend, Helenium autumnale praecox-Hybriden, die schönen, neueren Anemone japonica »Max Vogel« und »Bühler Kind«, sehr dunkelfarbige, graßblumige Aconitum Wilsoni-Hybriden, Solidaga hybr. Goldelfe und Goldschleier, Liatris graminifolia dubia, Thalictrum dipterocarpum und einige reinweiße, dichtgefüllte Nymphaeen.«

(Auf den großen Gartenbau-Ausstellungen zu Dresden 1926, Liegnitz 1927 und Magdeburg 1928 fand eine Prämilierung allgemein nicht statt.)

Hohe Auszeichnungen, viele silberne Medaillen, Geldpreise, goldene und silbervergoldete Medaillen, Plaketten, Ehrenpreise und als höchste Auszeichnung die große silberne kgl. preuß. Staatsmedaille, erhielt meine Firma auf den verschiedensten Gartenbau-Ausstellungen, auf denen ein Wettbewerb in Frage kam, so in Altona, Berlin, Braunschweig, Bremen, Cassel, Darmstadt, Dresden, Düsseldorf, Eberswalde, Hamburg, Hameln, Hannover, Mannheim, Minden, Pyrmont.

#### Zur Beachtung!

Die beste Pflanzzeit für die meisten Stauden, besonders in rauhen Gegenden mit schneelosen Wintern und in Gegenden mit schweren Bodenarten, ist das Frühjahr, von März bis Anfang Juni. Manche Stauden, wie Paeonien, Iris und andere, werden ebenso vorteilhaft im August—September, andere wiederum bis Ende Oktober gepflanzt. Viele Sorten lassen sich jedoch bei soffenems Wetter bis in den Winter hinein pflanzen.

Nach Eintreffen der Sendungen bei warmem, trockenem Wetter werden die Stauden nach vorsichtigem Auspacken an einem kühlen Ort am Boden ausgebreitet und tüchtig vüberbraust«, besonders auch die Wurzeln! Erst nachdem die Pflanzen sich erholt haben und frisch geworden sind, werden sie, morgens oder abends am besten, an ihren Bestimmungsort gepflanzt, vorsichtig mit der Fußspitze vangetreten« und je nach Bedürfnis vangegossen«. Bei Eintreffen der Sendung in gefrorenem Zustande läßt man die Pflanzen, vor dem Auspacken, an einem frostfreien, kühlen Ort auftauen.

Die Erwartungen, welche Liebhaber in den meisten Fällen auf eine vollkommene Entwicklung ihrer Stauden schon im ersten Jahre nach der Pflanzung setzen, werden bei vielen Sorten nicht in Erfüllung gehen, denn manche Stauden erlangen, ihrem Wachstum entsprechend, ihre vollkommene Ausbildung und Schönheit erst im zweiten oder dritten Jahre nach der Pflanzung. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden, da von der Behandlung und Pflege alles Gedeihen abhängt.


Liebhabern, die mit der Anpflanzung von Stauden nicht vertraut sind, füge ich auf Wunsch bei Lieferung von Stauden für Anlagen jeder Art, besonders auch für Steingärten, Uferpartien, Bachläufe usw., kostenlas Bepflanzungsangaben bei.

Vorherige genaue Mitteilung über Größe, Lage (ob Sonne, Schatten, Halbschatten), Himmelsrichtung usw. der zu bepflanzenden Flächen sind erforderlich. Gegebenenfalls sind mir auch Skizzen mit bereits bestehenden Baum- oder Gehölzpflanzungen, Bauten und dergl. bei Auftragserteilung erwünscht.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen, jedoch bitte ich, Sonntags Besuche möglichst zu unterlassen; jedenfalls aber wolle man Besuche, die für einen Sonntag geplant sind, einige Tage zuvor schriftlich anmelden.

An jedem **Feiertage** sowie **Sonntag nachmittags** bleibt meine Gärtnerei geschlossen. Die Monate Mai bis September sind für die Besichtigung meiner Kulturen am geeignetsten.

Nachdruck meiner Abbildungen wird strafrechtlich verfolgt!



Tägliche Personen-Dampfschiffahrt Hameln – Hann.-Münden (Mai-September).
5 Ueberland-Kraftverkehrslinien ins Weserbergland. Bahnverbindungen siehe 2. Umschlagseite vorn. — Führer durch den Verkehrsverein Hameln.

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stauden Junge
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer